

ሕክምና ለተደበቀ (ያልነቃ) የሳንባ-ነቀርሳ (ቲቢ) በሽታ ኣይሶንያዚድና ሪፋፔንቲን (ኣይ.ኤን.ኤች - ኣር.ፒ.ቲ) Isoniazid and Rifapentine (INH-RPT)

የእርስዎ የሕክምና ፈተናዎች የተደበቀ (ያልነቃ) የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ ወይም ኤል.ቲ.ቢ.ኣይ (LTBI) መኖርን ያሳያል። ይኸም ማለት ደግሞ የሳንባ-ነቀርሳ ሕዋሳቶች (ጀርሞች) በሰውነትዎ ጋር ስላሉ ሊያሳምምዎት ይችላሉ።

የሳንባ-ነቀርሳ ሕዋሳቶቹ ኣሁኑ ኣይጎድዎትም ወደ ሌላ ሰዎችም ኣይተላለፉም። ሕዋሳቶቹ ተኝተዋል እንደማለት ነው። ኣንዴ የሳንባ-ነቀርሳ ሕዋሳት ከነቁ ግን ሊያስታምምዎት ይችላሉ። ይኸም የነቃ የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ (ቲቢ) ይባላል።

የነቃ የሳንባ-ነቀርሳ በሽታን (ቲቢ) እንዴት መከላከልን እችላለሁ?

የነቃው የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ እንዲከላከሉ መድኃኒት መውሰድ ይችላሉ። ኣይሶንያዚድና ሪፋፔንቲን (Isoniazid and Rifapentine (ኣይ.ኤን.ኤች - ኣር.ፒ.ቲ) የሚባሉ መድኃኒቶች ኣብሮ ሲወሰዱ ንቁ የሳንባ-ነቀርሳ በሽታን ያክማሉ (ይከላከላሉ) ። እርስዎ ከመታመምዎ በፊት የተኙትን የሳንባ-ነቀርሳ ሕዋሳት ይገድላሉ። የሳንባ-ነቀርሳ ሕዋሳቶች በጣም ብርቱ ስለሆኑ መድኃኒቱ ሕዋሳቶችን ለመግደል ኣያሌ ወሮች ሊውሰድ ይችላል።

የ ኣይ.ኤን.ኤች - ኣር.ፒ.ቲ (INH-RPT) መድኃኒት ለመቀበል ለመዋጥ በሳምንት ኣንድ ጊዜ ከሓኪምዎ ወይም ከነርስ ጋር ይገናኛሉ። መድኃኒቱን ያለምግብ መዋጥ የተሻለ ነው። የሆድ ጭንቀት ሲሰምዎት ግን ትንሽ ምግብ መውሰድ ይቻላል።

ሳልታመም ለምን መድኃኒቱን መውሰድ (መዋጥ) ኣለብኝ?

ተኝተው ያሉትን (ያልነቁ) የሳንባ-ነቀርሳ ሕዋሳቶች ነቅተው እርስዎን ከመስታመምዎ በፊት ሕዋሳቶቹን መግደል ይቀላል።

ምንድነው መድኃኒቱን ባይውጥስ? (ምን ያስከትላል)?

የ ኣይ.ኤን.ኤች - ኣር.ፒ.ቲ (INH-RPT) መድኃኒትን ካልዋጡ (ካልወሰዱ)፣ ወይም ብዙ ቀኖች ሳይውጡ ሲቀሩ፣ ወይም ሓኪምዎ ወይም ነርስ መድኃኒቱን መዋጥ እንዲያቋርጡ ሳይነግርዎት ካቋረጡ፣ በ ነቃው የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ ሊታመሙ ይችላሉ። የእርስዎንና የቤተሰብዎን ጤና የተጠበቀ እንዲሆን የቲቢ ሕዋሳቶችን መግደል በጣም ኣስፈላጊ ነው።

ምንድነው የቢ.ሲ.ጂ (BCG) ከትባት ቢኖርኝ?

የ ቢ.ሲ.ጂ (BCG) ከትባት ለህጻናት ከብርቱ ዓይነት የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ ለጥቂት ዓመታት ሊከላከል ይችላል። ከ ኤል.ቲ.ቢ.ኣይ (LTBI) ያልነቃ የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ) ወይም ከነቃ የሳንባ-ነቀርሳ በሽታ ለመከላከል ግን ኣይችልም። የ ቢ.ሲ.ጂ (BCG) ከትባት ቢኖርዎትም የራስዎንና የሌሎችን ጤና እንዲጠብቁ የ ኤል.ቲ.ቢ.ኣይ (LTBI) መድኃኒት መዋጥ ኣለባቸው።

ለ ኣይ.ኤን.ኤች - ኣር.ፒ.ቲ (INH-RPT) መክፈል ባይችልስ?

ከሚነሱት የጤና ጥበቃ የሳንባ-ነቀርሳ ፕሮግራም፣ ነጻ የቲቢ መድኃኒት ለማግኘት፣ ሓኪምዎን ወይም ነርስዎን ይጠይቁ።



ወደ ሌላ ሰፈር ቢለቅስ?

ወደ ሌላ ከተማ ወይም ክፍለ-ሃገር ከመሄድዎ በፊት ሓኪምዎን ወይም ነርስዎን ይጎነጉ። ሰፈራችሁን ከለቀቃችሁ በኋላ የቲቢ መድኃኒት ያለማቋረጥ እንድታገኙ ዘንድ ይረዳሉ።

ስለ ኤል.ቲ.ቢ.አይ (LTBI) መድኃኒት ምን ማወቅ አለብኝ?

- ቢራ፡ ጠጅ፡ ወይም የአልኮል መጠጥ፡ የ ኤል.ቲ.ቢ.አይ (LTBI) ሕክምና እስከሚጨርሱ ድረስ እንዳይጠጡ። የ ኤል.ቲ.ቢ.አይ (LTBI) መድኃኒት እየዋጡ የአልኮል መጠጥ ከጠጡ ጉብትዎን ሊጎዱ ይችላሉ።
- ሌላ ዓይነት መድኃኒቶች የሚወስዱ ከሆኑ ሓኪምዎን ይጎነጉ።
- አይ.ኤን.ኤች - አር.ፒ.ቲ ን በምትወስዱበት ጊዜ ከነፍሱ-ጡርነት ይጠንቀቁ። ነፍሱ-ጡር መሆናቸውን ካወቁ ተሎ ወደ ሓኪምዎን ወይም ወደ ነርስዎን ይደውሉ።

አብዛኛው ሰዎች አይ.ኤን.ኤች - አር.ፒ.ቲ ን ያለ ምንም ችግር ይውጣሉ። አንዳንድ ሰዎች ግን ይኸንን የመሰለ ችግሮችን ይኖራቸዋል፡

- ትኩሳት፡ ከሶስት ቀን በላይ
- አነስተኛ የምግብ ፍላጎት ወይም የድካም ስሜት
- የሆድ ጭንቀት ወይም ማስመለስ (መትፋት)
- የሆድ ውጋት ወይም ቁርጠት
- ጥቁር ሽንት (የሻይ ወይም የቡና ቀለም)
- ብጫ ቆዳ ወይም ብጫ ዓይኖች
- የቆዳ ችፍ ማለት ወይም እከክ
- ደንዛዛ ወይም አሳካኪ እጆችና እግሮች

ከዚህ ሁሉ ችግሮች አንዲት ችግር ካላችሁ፡

1. መድኃኒቱን መዋጥ ያቋርጡ
2. ተሎ ወደ ሓኪምዎን ወይም ወደ ነርስዎን ይደውሉ። ለሚመጣው ቆጠሮን እንዳትጠብቁ።



መድኃኒትዎን ሓኪምዎን ወይም ነርስዎን እንደነገርዎት ይዋጡ። ብዙ ቀናት ሳይውጡ ካሳለፉ፡ መድኃኒቱ ላይሰራ ይችላል። የህክምና ቆጠራዎችን አክብሩ። ሓኪምዎን ወይም ነርስዎን ሕክምናችሁን በመልካም እንዲራመድ ይረዳሉ።

የሚመጣው የ ቲቢ ሕክምና ቆጠራ፡

- ቆን፡
- ሰዓት፡
- ሓኪም ወይም ነርስ፡
- ቦታ፡
- ቴሌፎን፡

Minnesota Department of Health
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program
P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
www.health.state.mn.us/tb