

# ከቢንቢ ንክሻ መከላከል



- ነፍሳትን ከቆዳ ማባረሪያ መቀባት። ማባረሪያውን ከፀሀይ መከላከያ ወይም ማስዋጊያ በላይ መቀባት።
- በዩኤስ ሊገዟቸው የሚችሏቸው ምርጥ ማባረሪያዎች ዲት (DEET) እና ፒካርዲን (picaridin) ነው።
- በክፍል ውስጥ ሲተኙ ከተቻለ በመስኮቶቹ ላይ መሸፈኛ ያለው ወይም የአየር ማናፈሻ ያለው ይሁን።
- አጎበር ባለው አልጋ (የቢንቢ አጎበር) ላይ ሊተኙ ይችላሉ። የአልጋ አጎበሩ ምርጥ በሆነው ቢንቢ ሊገል በሚችለው ፐርሚትሪን (permethrin) ሊረጭ ይችላል።
- ቢንቢ በማንኛውም ጊዜ ሊበላ (ሊነከስ) ሲችል ነገር ግን በምሽትና ጠዋት ቀደም ብሎ ንቁ ይሆናል።
- በነዚህ ጊዜአት ከቢንቢ ንክሻ ለመዳን በቤት ውስጥ መሆን።
- ውጭ ከሆኑ፣ ረጅም እጅጌ ያለውን ሽሚዝ፣ ረጅም ሱሪና ኮፍያ ማድረግ።

ወደ ውጭ ሀገር ጉዞ ለማድረግ እቅዱ አለኝ።



ቤተሰቤን ለመጠበቅ ምን ላድርግ?

# ወደ ዶክተርትን ወይም የጉዞ ክሊኒክ ይሂዱ

ከወባ የሚጠብቀው መድሀኒት (ወባ መከላከያ መድሀኒቶች ይባላሉ) በሀኪም ትእዛዝ ብቻ የሚገኝ ነው። ወባን ለመከላከል የሚሆነው መድሀኒት ለማግኘት ከጉዞዎት 4-6 ሳምንታት በፊት ወደ ዶክተርት መሄድ። በመጨረሻዎ ደቂቃ የሚጓዙ መንገዶች ቢሆኑም እንኳ ከጉዞአቸው በፊት ዶክተራቸው ጋር መሄድ ይህም አንዳንድ መድሀኒቶች ከጉዞ አንድ ቀን በፊት የሚጀመሩ ስለሆነ ነው።

መደበኛ ዶክተርትን ሊጎበኙ ይችላሉ ወይም ዶክተርትን በጤና መድሀኒት ኔትዎርክ የጉዞ ክሊኒክ ይኖር እንደሆነ ሊጠይቁ ይችላሉ።

ወባን ሊከላከል የሚችል ከአንድ መድሀኒት በላይ አለ። ለእርሶና ለልጆችዎ የበለጠ የሚስማማውን መድሀኒት ከዶክተርት ወይም ነርሶት ይጠይቁ።



ዶክተር ጋር መሄድ



ግዘገዳውን መመላት



መድሀኒቱን መውሰድ

በመድሀኒቱ ጠርመራ ላይ ያሉ መመሪዎችን ይከተሉ፡-

ከመሄድዎት በፊት መድሀኒቱን ይጀምሩ፤ እዛ ባሉበት ጊዜም መውሰድዎትን ይቀጥሉ እንዲሁም የወባ አካባቢውን ከለቀቁ በኋላም መድሀኒቱን መውሰድዎትን ይቀጥሉ። ሁሉንም እንክብሎች ወስደው መጨረስ እንዳለቦት ያስታውሱ ይህም የወባ አካባቢውን ከለቀቁ አንድ ወር በኋላም ሊቀጥል ይችላል። የዶክተርትን ቢሮ ከመልቀቅ በፊት መድሀኒቱን እንዴት መውሰድ እንዳለቦት መረዳትዎትን እርግጠኛ ይሁኑ።

በዩኤስ ካሉ ፋርማሲዎች መድሀኒቱን ይግዙ። ከሌላ ሀገራት የሚከፈቸው የወባ መድሀኒቶች ላይጠብቆት ጥችላል።

ሁሉም መድሀኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት ሊኖራቸው ይችላሉ። የማቅለሽለሽ፣ አልፎ አልፎ ማስታወክ ወይም ተቅማጥ የመሰለ የጎንዮሽ ጉዳት ካጋጠመ፣ በአብዛኛው የወባ መድሀኒቱን መውሰድዎትን ይቀጥሉ። የጎንዮሽ ጉዳቶች ካጋጠሙት ለዶክተርት ይደውሉ። ሌሎች የወባ መከላከያ መድሀኒቶች ይገኛሉ።



651-201-5414  
www.health.state.mn.us

Amharic  
9/2021