

Enfermedades de Transmisión Sexual

Chlamydia-Spa

Clamidia

(causada por *Chlamydia trachomatis*, una bacteria)

SEÑALES Y SÍNTOMAS

Síntomas de Clamidia:

- Comienza de 7 a 21 días después de ser expuesto
- Muchas personas no tienen síntomas

Síntomas de clamidia en las mujeres:

- Sangrado o flujo vaginal anormal
- Ardor o dolor al orinar
- Dolor en el abdomen
- Incomodidad en el ano

Síntomas de clamidia en los hombres:

- Flujo acuoso o ralo y blanco del pene
- Ardor o dolor al orinar
- Malestar en el ano

TRANSMISIÓN

La clamidia se propaga por:

- Relaciones sexuales por la vagina
- Relaciones sexuales por la boca
- Relaciones sexuales por el ano

COMPLICACIONES/CONSECUENCIAS

Si no recibe tratamiento, la clamidia puede:

- Causar embarazos ectópicos (en las trompas)
- Causar enfermedad inflamatoria de la pelvis
- Causar infertilidad en hombres y mujeres
- Contagiarse a otros compañeros sexuales

Clamidia y el embarazo:

- Puede contagiarse al recién nacido durante el alumbramiento y causar una grave infección de los ojos o pulmonía
- Puede conducir a parto prematuro y bajo peso al nacer

PREVENCIÓN

Recomendaciones para reducir la propagación de la clamidia:

- Usados consistente y correctamente, los condones de látex pueden reducir el riesgo de transmisión de clamidia

- Siempre use condones de látex durante relaciones sexuales por la vagina y el ano
- Use un condón de látex para sexo oral con el pene (felatorismo)
- Use una barrera de látex para sexo oral en la vagina o el ano (barrera dental o condón cortado a la mitad)
- Limite el número de compañeros sexuales
- Hágase una prueba con un médico u otro proveedor médico si sospecha infección
- Notifique inmediatamente a compañeros sexuales si tiene la infección
- Asegúrese de que los compañeros se hagan pruebas y reciban tratamiento

TRATAMIENTO

Tratamiento para clamidia:

- Medicamento apropiado recetado por un médico y tomado exactamente según las instrucciones (usar doxiciclina incorrectamente no curará la clamidia)
- Los remedios caseros no son eficaces
- Los compañeros deben recibir tratamiento al mismo tiempo

NOTA: Una persona puede volver a infectarse después del tratamiento.

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division

STD and HIV Section

Minnesota Department of Health

P.O. Box 9441

Minneapolis, MN 55440-9441

(612) 676-5414; (612) 676-5653 - sistema TTY

Línea directa de planificación familiar y enfermedades transmisión sexual de Minnesota (Minnesota Family Planning and STD Hotline) 1-800-783-2287 Voz/sistema TTY

Líneas directas nacionales de enfermedades transmisión sexual y SIDA del CDC (CDC National STD and AIDS Hotlines) 1-800-227-8922; 1-800-243-7889 TTY