

Gonorrea

(causada por *Neisseria gonorrhoea*, una bacteria)

SEÑALES Y SÍNTOMAS

- Pueden ser leves o estar ausentes, especialmente en mujeres
- Normalmente comienza de 2 a 7 días después de ser expuesto

Para mujeres:

- Sangramiento, flujo o picazón vaginal anormal
- Ardor o dolor al orinar o defecar
- Más dolor de lo normal durante los periodos menstruales
- Calambres y dolor en el abdomen
- Incomodidad, picazón o flujo del ano

Para hombres:

- Flujo espeso blanco o amarillo (pus) del pene
- Ardor o dolor al orinar o defecar
- Malestar, picazón o flujo del ano

TRANSMISIÓN

La gonorrea se propaga por:

- Relaciones sexuales por la vagina
- Relaciones sexuales por la boca
- Relaciones sexuales por el ano
- De una madre infectada al recién nacido

COMPLICACIONES

Si no recibe tratamiento, la gonorrea puede:

- Contagiar a otras parejas sexuales
- Causar enfermedad inflamatoria de la pelvis
- Causar embarazos ectópicos (en las trompas)
- Causar infertilidad en hombres y mujeres
- Causar infecciones de las articulaciones
- Hace que el VIH sea más fácil de transmitir o contraer durante el sexo

Gonorrea y el embarazo:

- La infección puede contagiar a un recién nacido durante el nacimiento
- Puede causar una grave infección de los ojos en el recién nacido
- Puede infectar otros órganos

PREVENCIÓN

- Evitar las relaciones sexuales vaginales, orales o anales es la mejor manera de prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual.
- Usados consistente y correctamente, los condones de látex pueden reducir el riesgo de transmisión de gonorrea.
- Siempre use condones de látex durante relaciones sexuales por la vagina y el ano.
- Use un condón de látex para sexo oral con el pene.
- Use una barrera de látex para sexo oral en la vagina o el ano (barrera dental o condón cortado a la mitad).
- Limite el número de parejas sexuales.
- Notifique inmediatamente a parejas sexuales si tiene la infección.
- Asegúrese de que las parejas se hagan la prueba y reciban tratamiento al mismo tiempo para evitar la reinfección.

PRUEBAS Y TRATAMIENTO

- Hágase un examen con un proveedor médico si sospecha infección.
- Puede curarse con el medicamento adecuado administrado por un médico.
- La gonorrea puede curarse con el medicamento adecuado recetado por un médico.
- Las parejas sexuales deben recibir tratamiento al mismo tiempo.

NOTA: Una persona puede reinfectarse después del tratamiento.

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Departamento de Salud de Minnesota,
Sección de enfermedades de transmisión sexual y VIH
(651) 201-5414
<http://www.health.state.mn.us/std>

Línea directa de planificación familiar y enfermedades
transmisión sexual de Minnesota
(Minnesota Family Planning and STD Hotline)
1-800-783-2287 Voz/sistema, (651) 645-9360 (Área
metropolitana)
<http://www.sexualhealthmn.org>

Asociación Americana de Salud Social (ASHA)
<http://www.ashastd.org>

Líneas directas nacionales de enfermedades
transmisión sexual y SIDA del CDC
(CDC National STD and AIDS Hotlines)
1-800-232-4636; 1-888-232-6348 - sistema TTY
<http://www.cdc.gov/std>, <http://www.cdc.gov/hiv>