

የአባላዘር ተላላፊ በሽታዎች እውነት ነገሮች

Genital Warts/HPV - Amh

የብልት ኪንታሮት/ኤች-ፒ-ቪ (በሰው ፓፒሎማ ቫይረስ የሚነሳ-ኤች-ፒ-ቪ)

የበሽታው ምልክቶች

የብልት ኪንታሮት የሚተላለፈው፡

- ቫይረሱ ከነኩ ከ 1 እንከ 6 ወሮች በኋላ
- በብልት ወይም ፊንጢጣ የሚወጣ ለስላሳ እብጠት
- በብልት አጠገብ ማቃጠልና ማሳከክ
- ኪንታሮት በሴት ብልትና ፊንጢጣ ሊደበቅ ይችላል
- ኪንታሮት አለሕክምና አይሄድም
- ኪንታሮት ሊሄድ ይችላል፡ ኤች-ፒ-ቪ ጀርም ግን ለብዙ ጊዜ ይቆያል

መተላለፍ

የብልት ኪንታሮት የሚጋባው፡

- በሴት ብልት ግብረሰጋ ግንኙነት
- በአፍ ግብረሰጋ ግንኙነት
- በፊንጢጣ ግብረሰጋ ግንኙነት
- ኪንታሮት ከያዘው ጋር ግንኙነት
- ከታመመች እናት ወደ አዲስ የተወለደ ሕጻን
- የኪንታሮት ኤች-ፒ-ቪ በሽታ ባይታይም ከታመመ ሰው ጋር አለ ኮንዶም (ላስቴክ) ከተገናኑ በሽታው ይጋባል

ጣጣውና የሚያስከትለው ችግር

የብልት ኪንታሮት ሳይታከም ከቀረ፡

- አዲስ ወደሚወለደው ሕጻን በመተላለፍ የጉሮሮ ኪንታሮት ሊፈጥር ይችላል
- ወደ ሌሎች የግብረሰጋ ተካፋዮች ይጋባል

አንዳንድ ቫይረሶች አስጊ የማህጸንና የብልት ካንሰር ሊያስከትሉ ሲችሉ አይታዩም። ስለዚህ፡ ግብረሰጋ የሚያደርጉ ሴቶች በያመቱ የፓፕሎማ ምርመራ ማድረግ አለባቸው።

ሃኪሞች ከካንሰር የተነሱትን ንቃቶች ለማግኘት ልዩ ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል።

መከላከል

የብልት ኪንታሮት እንዳይዛመት የሚረዱ አስተያየቶች፡

- የብልት ኪንታሮትና ኤች-ፒ-ቪ ቫይረስ አብዛኛው ጊዜ የኮንዶም መከላከያ በተደረገላቸው አካባቢ ነው የሚወጡት፡ መከላከያ ባልተደረገላቸው ቦታዎችም ሊወጡ ይችላሉ የላተክስ ኮንዶም የኤች-ፒ-ቪ በሽታን ሊከላከል የሚችሉት፡ የበሽታው ቦታ በኮንዶም ከተሸፈነ ብቻ ነው። በተጨማሪም ኮንዶም መጠቀም በኤች-ፒ-ቪ ቫይረስ የተነሳ የሚመጡት እንደ የማህጸን ካንሰር በሽታዎችስ ይከላከላል።
- የሴት ብልትና የፊንጢጣ ግብረሰጋ ሲያደርጉ፡ ሁሉንም በኮንዶም ያደርጉ
- የወንድ ብልትና አፍ ግብረሰጋ ሲያደርጉ የላቴክስ ኮንዶም ይጠቀሙ
- የሴት ብልትና አፍ ግብረሰጋ ሲያደጉ ኮንዶሙን በሁለት በመክፈል መከላከያ ያደርጉ
- የግብረሰጋ ተካፋዮችዎ ይቀንሱ
- የብልት ኪንታሮት ካለዎት ሃኪም ወይም በሌላ የህክምና አገልግሎት ይመርመሩ

የብልት ኪንታሮት/ኤች-ፒ-ቪ ህክምና

- ኪንታሮትን ለማከም ይቻላል፡ ለማዳን አይቻልም
- ሃኪም ያስፈልገዋል
- የሌላ ዓይነት ኪንታሮት የፋርማሲ ህክምና ከተጠቀሙ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል
- የሚታይ ኪንታሮት ካንሰር አያመጣም

ለተጨማሪ ማብራርያ በሚከተለው ይጠይቁ፡

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division
STD and HIV Section
Minnesota Department of Health
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
(651) 201-5414

Minnesota Family Planning and STD Hotline
1-800-783-2287 ድምጽ /TTY

CDC National STD and AIDS Hotlines
1-800-227-8922; 1-800-243-7889 TTY