

Linfogranuloma venéreo (LGV)

(causado por 3 subtipos de *Chlamydia trachomatis*, una bacteria)

NOTA: Este tipo de infección de clamidia es rara en los Estados Unidos. Si usted tiene indicios o síntomas de cualquier enfermedad de transmisión sexual, debe consultar a un proveedor de atención médica para evaluación y posible tratamiento.

INDICIOS Y SÍNTOMAS

Síntomas tempranos del LGV:

- Comienzan de 3 a 12 días o más después de la exposición
- Los síntomas tempranos por lo general pasan desapercibidos o nunca se presentan
- Úlcera o lesión rojiza sin dolor que se forma en o cerca de los genitales o el ano
- Las lesiones también pueden formarse en la garganta o boca debido al sexo oral
- La lesión sana rápidamente en pocos días

Síntomas posteriores del LGV:

- Comienzan de 2 a 6 semanas o más después de la lesión primaria
- Inflamación de los ganglios linfáticos en uno o ambos lados de la ingle
- Dolor al orinar o al defecar
- Estreñimiento
- Sangrado por el recto
- Dolor en el vientre o espalda
- Diarrea con sangre o pus
- Fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito y cansancio

TRANSMISIÓN

LGV se contagia por:

- Relaciones sexuales por la vagina
- Relaciones sexuales por la boca (sexo oral)
- Relaciones sexuales por el ano

COMPLICACIONES

De no tratarse, el LGV puede:

- Contagiarse a otras parejas sexuales
- Causar cicatrizaciones severas y genitales deformados
- Causar cicatrización del recto causando estrechez
- En las mujeres, crear una abertura entre la vagina y el ano (fístula)
- Desarrollar inflamación cerebral (muy raro)

PREVENCIÓN

- Evitar las relaciones sexuales vaginales, orales o anales es la mejor manera de prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual.
- Usados con consistencia y correctamente, los condones de látex pueden reducir el riesgo de transmisión del LGV.
- Siempre use condones de látex durante las relaciones sexuales por la vagina y el ano.
- Use un condón de látex para el sexo oral en el pene.
- Use una barrera de látex para el sexo oral en la vagina o el ano (dentera o condón cortado a la mitad).
- Limite el número de parejas sexuales.
- Notifique de inmediato a las parejas sexuales si tiene la infección.
- Asegúrese de que las parejas sexuales se hagan pruebas y reciban tratamiento.

PRUEBAS Y TRATAMIENTO

- Hágase un examen con proveedor médico si sospecha infección.
- Los remedios caseros no son efectivos.
- La parejas sexuales deben recibir tratamiento al mismo tiempo.

NOTA: Una persona puede reinfectarse aún después del tratamiento.

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Departamento de Salud de Minnesota,
Sección de enfermedades de transmisión sexual y VIH
(651) 201-5414

<http://www.health.state.mn.us/std>

Línea directa de planificación familiar y enfermedades
transmisión sexual de Minnesota
(Minnesota Family Planning and STD Hotline)
1-800-783-2287 Voz/sistema, (651) 645-9360 (Área metropolitana)

<http://www.sexualhealthmn.org>

Asociación Americana de Salud Social (ASHA)
<http://www.ashastd.org>

Líneas directas nacionales de enfermedades
transmisión sexual y SIDA del CDC
(CDC National STD and AIDS Hotlines)
1-800-232-4636; 1-888-232-6348 - sistema TTY
<http://www.cdc.gov/std>, <http://www.cdc.gov/hiv>