

Molusco

(causado por el *virus molluscum contagiosum*, VMC)

ANTECEDENTES

Generalmente, el molusco es una infección benigna y los síntomas pueden resolverse sin un tratamiento.

Antes el molusco era básicamente una enfermedad infantil pero ha evolucionado y se ha convertido en una enfermedad transmitida sexualmente en adultos.

SEÑALES Y SÍNTOMAS

Puede aparecer de una semana a seis meses después de contraer la infección, con un promedio de 2 a 3 meses:

- Lesiones indoloras, de color carne, blanco-grisáceo, amarillas o rosadas, que duran de 2 semanas a 4 años con un promedio de 2 años.
- Las lesiones aparecen en los genitales, el abdomen, el muslo interno o el área anal.
- Las lesiones pueden presentarse inicialmente como protuberancias pequeñas, pero pueden evolucionar a úlceras o protuberancias más grandes.
- Las personas con SIDA u otros con sistemas de inmunidad comprometida, pueden desarrollar numerosas lesiones.

TRANSMISIÓN

- Contacto sexual (el más común)
- Objetos inanimados: toallas y ropa
- Piscinas (albercas) y compartir baños
- Contacto de piel a piel
- Puede propagarse de una a otra parte del cuerpo (auto inoculación)

COMPLICACIONES

- Puede transmitirse a las parejas sexuales.
- Si también está infectado con el VIH, la infección de molusco podrá ser más severa.
- El molusco aumenta el riesgo de contraer otras infecciones de la piel.

PREVENCIÓN

- Evitar las relaciones sexuales vaginales, orales o anales es la mejor manera de prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual.
- Evite el contacto de piel-a-piel con una persona infectada.
- Limite el número de parejas sexuales
- Cuando los condones de látex se usan consistentemente y correctamente, pueden reducir el riesgo de contraer la infección molusco, sólo cuando las áreas afectadas están cubiertas o protegidas con el condón.
- Si está infectado con molusco, evite tocar la lesión y luego tocar otras partes de su cuerpo (auto inoculación). Los parejas deben recibir tratamiento al mismo tiempo.

PRUEBAS Y TRATAMIENTO

- Hágase un examen con un proveedor médico si sospecha infección.
- Al extirpar las lesiones se reduce la auto inoculación y transmisión a otros.

Se puede lograr la extirpación de las lesiones con:

- Cirugía o electro cirugía
- Quimioterapia
- Crioterapia

Nota: Las lesiones pueden repetirse después del tratamiento.

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Departamento de Salud de Minnesota,
Sección de enfermedades de transmisión sexual y VIH
(651) 201-5414; (651) 201-5797 TTY
<http://www.health.state.mn.us/std>

Línea directa de planificación familiar y enfermedades transmisión sexual de Minnesota
(Minnesota Family Planning and STD Hotline)
1-800-783-2287 Voz/sistema, (651) 645-9360 (Área metropolitana)
<http://www.sexualhealthmn.org>

Asociación Americana de Salud Social (ASHA)
<http://www.ashastd.org>

Líneas directas nacionales de enfermedades transmisión sexual y SIDA del CDC
(CDC National STD and AIDS Hotlines)
1-800-232-4636; 1-888-232-6348 - sistema TTY
<http://www.cdc.gov/std>, <http://www.cdc.gov/hiv>