

# የአባላዘር ተላላፊ በሽታዎች እውነት ነገሮች

Syphilis (“Syph”, “The Pox”) - Amh

## ቂጥኝ

### የበሽታው ምልክቶች

የመጀመርያ ደረጃ ቂጥኝ፡

- 1-12 ሳምንት ጀርም መንካት በኋላ
- የማያም ቁስል፡ ባፍ፡ በብልትን ቂጥ ላይ ይወጣል
- ቁስሎች በሴት ብልትና ፊንጢጣ ከ1-5 ሳምንት ሊደበቁ ይችላሉ
- ቁስሉ ቢድንም ቂጥኝ ደም ውስጥ ይቀራል

የሁለተኛ ደረጃ ቂጥኝ፡

- ምልክቶቹ ከ6 ሳምንት እስከ 6ወር ቁስል መውጣት በኋላ ይታያሉ
- በሽፍታ በሆነ ቦታ ይወጣል
- እንደጉንፋን መያዝ ይመስላል

የመጨረሻው ደረጃ፡

- ቁስል ወይም ሽፍታ የለውም። ቅጢኝ ግን ደም ውስጥ ስላለ ፡ ልብ አንጎልና ሌሎች አካሎችን ቆይቶ ሊነካ ይችላል።

### መተላለፍ

ቅጢኝ የሚተላለፈው፡

- በሴት ብልት ግብረሰጋ ግንኙነት
- ባፍ ግብረሰጋ ግንኙነት
- በፊንጢጣ ግብረሰጋ ግንኙነት
- ከታመመች እናት ወደተወለደ ህጻን

### ጣጣውና የሚያስከትለው ችግር

ቂጥኝ ሳይታከም ከቀረ፡

- የልብ በሽታ
- ዓይነ ስወርነት
- ያንጎል ብልሽትን ያስከትላል

ቂጥኝ በእርግዝና የሚያስከትለው፡

- የሞተ ህጻን መውለድ
- አካለ ጎደለነት
- በታመሙ ህጻኖች ላይ ከባድ ያጥንት በሽታና፡ አንጎል ሳንባና ሌሎች አካሎችን ያበላሻል

### መከላከል

የቂጥኝን መተላለፍ ለመቀነስ የሚረዱ አስተያየቶች፡

- የአባላዘር ቁስል በሽታዎች በላቴክስ ኮንዶም በተሸፈኑ ቦታዎች ሊወጡ ይችላሉ። ባልተሸፈኑና መከላከያ ባልተደረገላቸውም ሊወጡ ይችላሉ። የላቴክስ ኮንዶም የሚከላከሉት በትክክል ከተጠቀሙባቸውና የበሽታ ቦታዎችን በደንብ ከተሸፈኑ ነው።
- የሴት ብልትና ፊንጢጣ ግብረሰጋ ሲያደርጉ የላቴክስ ኮንዶም፡ ሁሉግዜና፡ በደንብ ይጠቀሙ
- ባፍና ቁላ ግብረሰጋ ኮንዶም ይጠቀሙ
- ያፍ ግብረሰጋ በወንድ ብልትና ፊንጢጣ ሲያደርጉ ኮንዶሙን በሁለት ቆርጠው መከላከያ ያደርጉ
- የግብረሰጋ ተካፋዮችዎ ይቀንሱ
- የበሽታው ጥርጣሬ ካለዎት የሃኪም ወይም ሌላ የህክምና ድርጅት በመሄድ ይመርመሩ
- ከታመሙ ለግብረሰጋ ተካፋዮችዎ ያስታውቁ
- ተካፋዮችዎ ተመርምረው እንዲታከሙ ያደርጉ

### ሕክምና

የቂጥኝ ህክምና፡

- ቂጥኝ ከሃኪም ተገቢ ህክምና ካገኘ ሊድን ይችላል
- ተካፋዮች አብረው መታከም አለባቸው

ማስታወሻ፡ የታከመ መልሶ ሊታመም ይችላል

**ለተጨማሪ ማብራርያ በሚከተለው ይጠይቁ፡**

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division  
 STD and HIV Section  
 Minnesota Department of Health  
 P.O. Box 64975  
 St. Paul, MN 55164-0975  
 (651) 201-5414

Minnesota Family Planning and STD Hotline  
 1-800-783-2287 ድምጽ /TTY

CDC National STD and AIDS Hotlines  
 1-800-227-8922; 1-800-243-7889 TTY