

Sífilis

(causada por *Treponema pallidum*, una bacteria)

SEÑALES Y SÍNTOMAS

1ª Etapa (sífilis primaria)

- Los síntomas aparecen de 1 a 12 semanas después de ser expuesto
- Una llaga abierta **no dolorosa** en la boca, los órganos sexuales o el ano
- Las llagas pueden estar “ocultas” en la vagina o el recto; las llagas duran de 1 a 5 semanas
- Las llagas desaparecen, pero la sífilis todavía está en la sangre

2ª Etapa (sífilis secundaria)

- Los síntomas aparecen de 6 semanas a 6 meses después de que aparece la llaga
- Una erupción en cualquier parte del cuerpo
- Síntomas parecidos a los de la influenza
- Pueden ocurrir parches blanco-grisáceos en la boca/labios, lesiones similares a verrugas alrededor de los genitales, y/o caída del cabello, pero son menos comunes

Etapa latente

- No hay llagas ni erupciones, pero la sífilis todavía está en la sangre y puede afectar el corazón, el cerebro y otros órganos con el paso del tiempo (sífilis terciaria)

TRANSMISIÓN

La sífilis se propaga por:

- Relaciones sexuales por la vagina
- Relaciones sexuales por la boca
- Relaciones sexuales por el ano
- De una madre infectada al recién nacido

COMPLICACIONES

Si no recibe tratamiento, la sífilis puede causar:

- Que se transmita la infección a los compañeros sexuales
- Enfermedad del corazón
- Ceguera
- Daños cerebrales
- Hace que el VIH sea más fácil de transmitir o contraer durante el sexo

La sífilis durante el embarazo puede causar:

- Que los bebés nazcan muertos
- Defectos de nacimiento congénitos
- Daños severos a los huesos, el cerebro, los pulmones, el hígado y otros órganos en los bebés infectados

PREVENCIÓN

- Evitar las relaciones sexuales vaginales, orales o rectales es la mejor manera de prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual.
- Cuando se usan consistente y correctamente, los condones de látex pueden reducir el riesgo de sífilis, sólo cuando las áreas afectadas están cubiertas o protegidas con el condón.
- Siempre use condones de látex durante relaciones sexuales por la vagina y el ano.
- Use un condón de látex para sexo oral con el pene.
- Use una barrera de látex para sexo oral en la vagina o el ano (barrera dental o condón cortado a la mitad).
- Limite el número de compañeros sexuales.
- Notifique inmediatamente a compañeros sexuales si tiene la infección.
- Asegúrese de que los compañeros se hagan pruebas y reciban tratamiento.

PRUEBAS Y TRATAMIENTO

- Hágase un examen con un proveedor médico si sospecha infección.
- La sífilis puede curarse con el medicamento adecuado recetado por un médico.
- Los compañeros deben recibir tratamiento al mismo tiempo.

NOTA: Una persona puede volver a infectarse después del tratamiento.

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Departamento de Salud de Minnesota,
Sección de enfermedades de transmisión sexual y VIH
(651) 201-5414; (651) 201-5797 TTY
<http://www.health.state.mn.us/std>

Línea directa de planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual de Minnesota
(Minnesota Family Planning and STD Hotline)
1-800-783-2287 Voz/sistema ; (651) 645-9360 (Área metropolitana)
<http://http://www.stdhotline.state.mn.us>

Asociación Americana de Salud Social (ASHA)
<http://www.ashastd.org>

Líneas directas nacionales de enfermedades de transmisión sexual y SIDA del CDC
(CDC National STD and AIDS Hotlines)
1-800-232-4636; 1-888-232-6348 - sistema TTY
<http://www.cdc.gov/std>, <http://www.cdc.gov/hiv>