

Enfermedades de Transmisión Sexual

Syphilis (“Syph”, “The Pox”)-Spa

Sífilis

(causada por *Treponema pallidum*, una bacteria)

SEÑALES Y SÍNTOMAS

1ª Etapa (sífilis primaria)

- Los síntomas aparecen de 1 a 12 semanas después de ser expuesto
- Una llaga abierta **no dolorosa** en la boca, los órganos sexuales o el ano
- Las llagas pueden estar “ocultas” en la vagina o el recto; las llagas duran de 1 a 5 semanas
- Las llagas desaparecen, pero la sífilis todavía está en la sangre

2ª Etapa (sífilis secundaria)

- Los síntomas aparecen de 6 semanas a 6 meses después de que aparece la llaga
- Una erupción en cualquier parte del cuerpo
- Síntomas parecidos a los de la influenza

Etapa latente

- No hay llagas ni erupciones, pero la sífilis todavía está en la sangre y puede afectar el corazón, el cerebro y otros órganos con el paso del tiempo (sífilis terciaria)

TRANSMISIÓN

La sífilis se propaga por:

- Relaciones sexuales por la vagina
- Relaciones sexuales por la boca
- Relaciones sexuales por el ano
- De una madre infectada al recién nacido

COMPLICACIONES/CONSECUENCIAS

Si no recibe tratamiento, la sífilis puede causar:

- Enfermedad del corazón
- Ceguera
- Daños cerebrales

La sífilis durante el embarazo puede causar:

- Que los bebés nazcan muertos
- Defectos de nacimiento congénitos
- Daños severos a los huesos, el cerebro, los pulmones, el hígado y otros órganos en los bebés infectados

PREVENCIÓN

Recomendaciones para reducir la propagación de la sífilis:

- Las enfermedades de úlceras genitales pueden desarrollarse en áreas genitales cubiertas o protegidas por un condón de látex. También pueden

desarrollarse en áreas que no están cubiertas o protegidas. Usados consistentemente y correctamente, los condones de látex pueden reducir el riesgo de sífilis únicamente si las áreas infectadas están cubiertas o protegidas por el condón.

- Siempre use condones de látex durante relaciones sexuales por la vagina y el ano
- Use un condón de látex para sexo oral con el pene (felatorismo)
- Use una barrera de látex para sexo oral en la vagina o el ano (barrera dental o condón cortado a la mitad)
- Limite el número de compañeros sexuales
- Hágase una prueba con un médico u otro proveedor médico si sospecha infección o contagio
- Notifique inmediatamente a compañeros sexuales si tiene la infección
- Asegúrese de que los compañeros se hagan pruebas y reciban tratamiento

TRATAMIENTO

Tratamiento para sífilis:

- La sífilis puede curarse con el medicamento adecuado recetado por un médico
- Los compañeros deben recibir tratamiento al mismo tiempo

NOTA: Una persona puede volver a infectarse después del tratamiento.

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division
STD and HIV Section
Minnesota Department of Health
P.O. Box 9441
Minneapolis, MN 55440-9441
(612) 676-5414; (612) 676-5653 - sistema TTY

Línea directa de planificación familiar y enfermedades transmisión sexual de Minnesota
(Minnesota Family Planning and STD Hotline)
1-800-783-2287 Voz/sistema TTY

Líneas directas nacionales de enfermedades transmisión sexual y SIDA del CDC
(CDC National STD and AIDS Hotlines)
1-800-227-8922; 1-800-243-7889 - sistema TTY