


Minnesota Department of Health ການແຜ່ຂະຍາຍຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌

ຖ້າທ່ານກວດພົບວ່າທ່ານມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ທີ່ສາມາດຕິດ ຕໍ່ສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້ມີດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

- ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ເປັນພຍາດທີ່ອັນຕະຣາຍແຕ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ ຖ້າຮັກສາຖືກວິທີທາງແລະມີຢາປິ່ນປົວທີ່ດີ.
- ຜູ້ທີ່ມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ບາງຄົນສາມາດທີ່ຈະແຜ່ລະບາດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້ໂດຍງ່າຍ.

ຂ້ອຍຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ທຸກຄົນສາມາດຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ໄດ້, ເມື່ອຜູ້ມີເຊື້ອໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງ ໃນປອດນັ້ນໂອ, ຈາມ, ຫຼືປາກເວົ້າ, ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນັ້ນຈະກະຈາຍ ຫຼືປົວໄປຕາມລົມອອກນາສູ່ອາກາດພາຍນອກ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ກໍສາມາດ ທີ່ຈະຫາຍໃຈເອົາ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ເຂົ້າໄປໃນປອດຂອງເຂົາ. ທ່ານຈະບໍ່ຕິດເຊື້ອໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງໄດ້ຈາກການຈັບມື, ຫຼືຈາກອາ ຫານ, ຖ້ວຍຊາມ, ຜ້າແພຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.




ໃນເມື່ອ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ມັນຈະ “ຜັກຕົວຢູ່” ນີ້ເອີ້ນວ່າ “latent TB infection” ຫຼືຊື່ ຫຍໍ້ວ່າ “LTBI” “ໃນລະຍະການຜັກຕົວຢູ່” ຂອງ ເຊື້ອ ວັນນະໂຣຄ໌ ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນອັນ ຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເທື່ອ ຫຼືເຮັດໃຫ້ ທ່ານປວຍໄຂ້ໄດ້ເທື່ອ. ການຜັກຕົວນອນຢູ່ຂອງເຊື້ອໂຣຄ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ຕົນ ຫຼືອາດຈະຕົນຫຼາຍປີ. ທ່ານຈະເຈັບປວຍໄຂ້ຈາກ ເຊື້ອ ວັນນະໂຣຄ໌ ນີ້ເມື່ອເຊື້ອໂຣຄ໌ “ຜິ່ນຕົວຂຶ້ນ”

ແລະກໍຕົວໃຫ້ຍື່ນແລະມັນກໍຈະສາມາດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ນີ້ເອີ້ນວ່າ **ການແຜ່ ຂະຍາຍຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌.**

ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງໃດ?

ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນັ້ນຕາມປົກກະຕິມັນຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ປອດ ຂອງທ່ານ (pulmonary TB). ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຍັງຈະ ທຳຮ້າຍຕໍ່ອະວັນຍະວະຕ່າ ງໆຂອງຮ່າງກາຍຄືກັນ.



ຜູ້ທີ່ມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນັ້ນອາດຈະມີອາການຕ່າງໆ ຢ່າງ ນ້ອຍກໍເປັນນິ່ງອາການຫາຫຼາຍອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ:

- ໂອຕິດຕໍ່ກັນເຖິງສອງສາມອາທິດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
- ຈ່ອຍລົງ, ນ້ຳໜັກລຸດລົງ
- ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ
- ມີເຫືອອອກຕອນກາງຄືນ
- ເປັນໄຂ້
- ເປັນໜາວ
- ຮູ້ສຶກອ່ອນເພັຍຫຼືບໍ່ມີເຫືອແຮງ
- ເຈັບທີ່ໜ້າເອິກ
- ໂອອອກເປັນເລືອດຫຼືມີສິ່ງໃດ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ເປັນສີນ້ຳຕານຕິດອອກມາ

ທ່ານໝໍກວດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ດ້ວຍວິທີໃດ?

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງກວດເບິ່ງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນັ້ນຢ່າງນ້ອຍກໍຫຼາຍ ກວ່ານຶ່ງເທື່ອ:

- ການກວດແບບສັກເຊື້ອຢາຝັງໄວ້ທີ່ໄດ້ຜິວໜັງ ນີ້ສາມາດຈະ ຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານມີ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫຼືບໍ່. ເຖິງ ແນ່ນວ່າ ເຊື້ອໂຣຄ໌ນັ້ນຍັງ "ນອນຜັງຕົວ" ກໍຕາມ.
- ການສ່ອງໄຟຟ້າຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຊື້ອໂຣຄ໌ນັ້ນໄດ້ທຳຮ້າຍປອດ ຂອງທ່ານແລ້ວຫຼືບໍ່.
- ການກວດຈາກຂີ້ກະເທີແບບສມັຍເກົ່ານັ້ນ ຈະບອກໃຫ້ ຮູ້ວ່າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນັ້ນໄດ້ ກໍຕົວໃຫ້ຍື່ນໃນປອດຂອງທ່ານ ແລ້ວຫຼືຍັງ.


ຂ້ອຍຈະຕິຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ທ່ານຕ້ອງໄປຫາແພທແລະກິນຢາຕ້ານ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ເປັນພິເສດເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າເຊື້ອໂຣຄ໌ນັ້ນ.
- ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ນັ້ນມີຜິດແຮງ ແລະ ມັນມີຊີວິດຢູ່ດົນນານ. ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຕິຂຶ້ນພາຍໃນສອງອາທິດຫຼັງຈາກທ່ານກິນຢາຕ້ານ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ໄດ້ຖືກ ຂ້າໝົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກິນຢາສືບຕໍ່ໄປຢ່າງນ້ອຍ 6-9 ເດືອນ.
- ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄປຝົບທ່ານໝໍທຸກເດືອນ ຈົນກວ່າ ການຮັກສາ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຂອງທ່ານຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ. ແພທຈະກວດເບິ່ງອີກເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິຂຶ້ນຫຼືຖ້າທ່ານມີ ບັນຫາໃນການຢາກິນຫຼືມີຄຳຖາມອື່ນໆ.

ຈະເປັນຢ່າງໃດຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຢາກກິນຢາຮັກສາ?

ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ ຈະເປັນແຮງຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ກິນຢາຖືກ ວິທີການ ຫຼືບໍ່ກິນໃຫ້ໝົດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໝໍ. ທ່ານອາດຈະ ເລີ່ມ ປວຍໄຂ້ອີກ ແລະແຜ່ເຊື້ອໂຣຄ໌ນັ້ນໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນ.

ທ່ານຕ້ອງ ກິນຢາໃຫ້ໝົດ ແລະປະຕິບັດຕາມຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ໝໍເພື່ອຈະໄດ້ຕິຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ກິນຢາຖືກຕ້ອງຕາມວິທີທີ່ຕາມ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໝໍ, ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ໌ຂອງທ່ານອາດຈະກໍຕົວ ແຮງຂຶ້ນ. ເຖິງເວລານັ້ນທ່ານຈະໄດ້ກິນຢາຮັກສາທີ່ແຮງແລະຈະ ຕ້ອງໃຊ້ ເວລາຮັກສາຍາວນານ.



ການແຜ່ຂະຍາຍຂອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄ - ຫນ້າທີ 2

DOT ຫມາຍເຖິງຫຍັງ?

“DOT” ຫມາຍເຖິງການກຳກັບເບິ່ງອາການໂດຍກົງ. DOT ຈະເຮັດໃຫ້ການກິນຢາງ່າຍຂຶ້ນ, DOT ແມ່ນເວລານາຍແພທ ຫຼືນາງພຍາບານພົບກັບທ່ານໃນທຸກໆທີ່ເອົາຢາແກ້ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ ປອດແຫ້ງ ໃຫ້ທ່ານກິນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທາງວ່າຍໆແບບນຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ກິນຢາຂອງທ່ານຈົດໝົດຕາມກຳນົດແລະອາການກໍຈະດີຂຶ້ນ ຖ້າຫາກມີບັນຫາກັບຢາກິນ ເພິ່ນກໍສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນຢາໃຫມ່ໃຫ້ ທ່ານທັນທີ.

DOT ຈະປິ່ນປົວເຊື້ອວັນນະໂຣຄໄດ້!

ຂ້ອຍຈະແຜ່ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຖ້າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຫາກຢູ່ໃນປອດຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງ ລະວັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕິດ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຈາກທ່ານ. ຖ້າເຊື້ອ ວັນນະໂຣຄ ຫາກຢູ່ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນຈະບໍ່ແຜ່ໄປ ໃສ່ຜູ້ໄດ້.

ໃຫ້ຖາມນຳທ່ານຫມໍຫຼືນາງພຍາບານ ວ່າ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຂອງທ່ານ ນີ້ສາມາດແຜ່ໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ບໍ່ຫຼື (ຕິດລະບາດ). ເພິ່ນຈະ ແນະນຳວິທີ ການປະຕິບັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນທີ່ຢູ່ໄກທ່ານຕິດເຊື້ອໂຣກນີ້ໄດ້.

ຫຼັງຈາກທ່ານກິນຢາໄດ້ສອງສາມອາທິດແລ້ວ ແລະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອໂຣກປອດແຫ້ງນັ້ນໃສ່ ຜູ້ອື່ນໄດ້. ນາຍແພທຈະບອກທ່ານວ່າທ່ານຄວນຈະກັບໄປທຳງານ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼືທຳກິຈະກຳອື່ນໆໄດ້.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ເຮືອງເຊື້ອວັນນະໂຣຄເພິ່ນຕື່ມໄດ້ຢູ່ໃສ?

- ໃຫ້ຖາມນຳນາຍແພທ ຫຼືນາງພຍາບານເພື່ອຂໍເອົາຂໍ້ມູນ ເຮືອງ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄ ໄດ້ຟຣີ ຈາກກະຊວງສາທາຣະນະສກ ຣັຖມົນນີໂຊ ຕາ.
- ໃຫ້ບອກທ່ານຫມໍຫຼືນາງພຍາບານຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີແຜນການ ທີ່ຈະຍົກຍາຍໄປຢູ່ຕ່າງເມືອງຫຼືຕ່າງຣັຖ. ເພິ່ນຈະໄດ້ຊ່ວຍທ່ານ ບ່ອນໄປເອົາຢາ ຫຼັງຈາກທ່ານຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃຫມ່.
- ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອວັນນະໂຣຄ, ໃຫ້ຖາມນຳນາຍແພທເພື່ອຂໍໃຫ້ ກວດຫາ ເຊື້ອໂຣກເອັສນຳ. ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໂຣກເອັສໃນຮ່າງກາຍຈະ ປ່ວຍ ໃຂ້ແລະແຮງກວ່າ ຖ້າມີເຊື້ອວັນນະໂຣຄນຳ, ທ່ານຈະ

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຣກປອດແຫ້ງສາມາດຮັກສາໄດ້ !

ຢາຮັກສາໂຣກປອດແຫ້ງມີຢາຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍຄວນຮູ້ຈັກ?

- ຢາຮັກສາໂຣກປອດແຫ້ງເປັນຢາກິນທີ່ປອດພ້ຍ, ແຕ່ບາງຄົນ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີອາການຕ່າງໆ, ໃຫ້ໂທຣສັບໄປຫາ ນາຍແພທຂອງທ່ານທັນທີ ຖ້າທ່ານມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊັ່ນ:
 - ຮາກ, ເຈັບຫວັງ
 - ກິນເຂົ້າບໍ່ເຊບ
 - ອົງອຽນ
 - ຕາເຫຼືອງ ຫຼື ຜິວເຫຼືອງ
 - ສຽວທີ່ນິ້ວມືຫຼືທີ່ນິ້ວຕີນ
 - ສຽວຫຼືມືນປາກ
 - ມືວຕາ ຫຼື ສາຍຕາຟາງ
 - ສຽວກ້ອງຢູ່ໃນຫູ
 - ຫູບໍ່ໄດ້ຍິນດີ
 - ອິນຫົວ
 - ປອດຕາມຂໍ້ກະດູກ
 - ເປັນໂຂ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ວັນ
 - ເປັນຜິ່ນແດງຕາມຜິວຫນັງ
 - ເລືອດອອກງ່າຍຫຼືມີຮອຍຝຶກຊ້າງ່າຍ
- ກິນຢາຮັກສາ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄຂອງທ່ານເຖົ້ານັ້ນໃຫ້ກົງເວລາ ຂອງທຸກໆມື້.
- ກິນຢາຮັກສາ ເຊື້ອວັນນະໂຣຄໄປຈົນກວ່າທ່ານຫມໍຈະບອກໃຫ້ ທ່ານເຊົາ.
- ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕື່ມເບ້ຍ, ເຖົ້າວາຍ, ຫຼືເຖົ້າ ໃນຂະນະທີ່ກິນຢາຮັກສາໂຣກ ປອດແຫ້ງນີ້.

ຄລິນິກຂອງທ່ານ/ທ່ານຫມໍ/ນາງພຍາບານ: _____

ໂທຣສັບ #: (_____) _____

ຢາຮັກສາໂຣກປອດແຫ້ງມີຄື:

- ___ Isoniazid (“INH”)
- ___ Rifampin
- ___ Pyrazinamide (“PZA”)
- ___ Ethambutol
- ___ Vitamin B6
- _____
- _____



Tuberculosis Prevention and Control Program
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
1-877-676-5414
www.health.state.mn.us/tb