

# ການປິ່ນປົວ ການຕິດເຊື້ອ ວັນນະໂລກ ໄລຍະທີ່ເຊື້ອ ໂລກແຜງຕົວຢູ່ (TB) ດ້ວຍຢາ Rifampin

ຜົນກວດຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອ ວັນນະໂລກ ໄລຍະທີ່ເຊື້ອໂລກແຜງຕົວຢູ່ (TB) ຫລື ການຕິດເຊື້ອ ວັນນະໂລກ ໄລຍະທີ່ເຊື້ອໂລກແຜງຕົວຢູ່ (LTBI) ມີໝາຍຄວາມວ່າເຊື້ອພະຍາດ TB ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ວຍ.

ເຊື້ອພະຍາດ TB ບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປ່ວຍແລະບໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອຫາຄົນອື່ນ. ຄືກັນກັບວ່າເຊື້ອພະຍາດຢູ່ໃນພາວະເຫງົາອອນ. ຖ້າ ເຊື້ອພະຍາດ TB ຕົ້ນຂຽມໃດ, ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ວຍໄດ້. ມີເອີ້ນວ່າ ພະຍາດ TB ທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອ. ທ່ານສາມາດແຜ່ເຊື້ອ TB ຫາຄົນອື່ນໄດ້ ຖ້າທ່ານມີ ພະຍາດ TB ທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອ.

## ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນພະຍາດ TB ທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອອອນໃດແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດກິນຢາເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດ TB ທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອ. ຢາ Rifampin ແມ່ນເປັນຢາທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນການປິ່ນປົວ LTBI. ມັນຂ້າເຊື້ອພະຍາດ TB ທີ່ອອນຫລັບ ກ່ອນພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ວຍ. ມັນສາມາດໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນສໍາລັບຢາໃນການທໍາລາຍເຊື້ອພະຍາດ TB ເພາະວ່າພວກມັນແຂງແຮງຫລາຍ.

ໃຊ້ຢາ Rifampin ເລື້ອຍໆຕາມທີ່ທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງທ່ານແນະນໍາ. ກິນຢາ Rifampin ໃດຍບໍ່ກິນອາຫານແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ຖ້າກະເພາະອາຫານຂອງທ່ານບໍ່ປ່ວນ, ກິນຢາ Rifampin ກັບອາຫານໜ້ອຍໜຶ່ງກໍ່ດີເຊັ່ນກັນ ຫລື ລອງກິນຢາໃນຊ່ວງເວລາອອນກາງຄືນ.

## ຍ້ອນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງກິນຢາທາງໂທຂອຍບຣູສກັບປ່ວຍ?

ເຊື້ອພະຍາດ TB ທີ່ອອນຫລັບແມ່ນງ່າຍໃນການຖືກທໍາລາຍກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຕົ້ນຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ວຍໄດ້.



## ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ກິນຢາ ຈະເປັນຫຍັງບໍ່?

ຖ້າທ່ານບໍ່ກິນຢາ Rifampin, ຂາດຢາຫລາຍວັນ ຫລື ຢາກິນຢາກ່ອນທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານແນະນໍາທ່ານ, ທ່ານອາດປ່ວຍໄດ້ໂດຍທີ່ຮ່າງກາຍທ່ານບໍ່ມີ ພະຍາດ TB ທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອກໍ່ຕາມ. ມັນສໍາຄັນໃນການທໍາລາຍ ຫລື ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ TB ເພື່ອທີ່ຕົວທ່ານແລະຄອບຄົວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

## ຖ້າຂ້ອຍມີວັກຊີນ BCG (BCG VACCINE) ເດີ ຈະເປັນຫຍັງບໍ່?

BCG ບໍ່ປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍ ຈາກ TB ທີ່ມີຮູບຮ້າຍແຮງ ແຕ່ບໍ່ປ້ອງກັນໄດ້ພຽງສອງສາມປີເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ ການໄດ້ຮັບພະຍາດ LTBI ຫລື ພະຍາດ TB ທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ BCG ແລ້ວ, ທ່ານຄວນຈະກິນຢາ ສໍາລັບ LTBI ນໍາດ້ວຍ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະຄົນອື່ນ.

## ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຈໍາລຳຢາ Rifampin ຈະເປັນຫຍັງບໍ່?

ຂໍຄໍາແນະນໍາກັບທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງທ່ານໃນການຮັບຢາ TB ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃດໆ ຈາກ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວກັບ ວັນນະໂລກ ຂອງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ມິນເນສໂວຕາ (Minnesota Department of Health Tuberculosis Program).

# ຖ້າຂ້ອຍຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ ຈະ ເຮັດແນວໃດ?

ສະເໜີຕໍ່ທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງທ່ານກ່ອນທ່ານ ຍົກຍ້າຍໄປລັດ ຫລື ເມືອງອື່ນ. ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍ ທ່ານຮັບ ຢາ TB ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫລັງຈາກທ່ານຍົກຍ້າຍ.

## ແມ່ນຫຍັງທີ່ຂ້ອຍຄວນ ຈະຮຽນຮູ້ກັບ ຢາຮກສາ LTBI ບໍ່?

- ຫ້າມດື່ມເບຍ, ເຫຼົ້າອາຫານ ຫລື ເຫຼົ້າ ຈົນກວ່າທ່ານ ສໍາເລັດ ການປິ່ນປົວ LTBI ຂອງທ່ານ. ດື່ມເຫຼົ້າໃນ ຂະນະທີ່ກິນຢາ Rifampin ສາມາດເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຕັບ ຂອງທ່ານ.
- ບອກທ່ານໝໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຢາອື່ນໆທີ່ທ່ານ ກໍາລັງໃຊ້ ຫລື ກິນ.
- ໃຊ້ວິທີໃຊ້ເຄື່ອງຂວາງກັນ ເຊັ່ນ ຖົງຢາອະນາໄມ ເພື່ອ ປ້ອງກັນຈາກການຖືພາ. Rifampin ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການຄຸມກໍາເນີດໂດຍໃຊ້ ໂຮຣໂມນທ່າງານບໍ່ໄດ້ດີ. ລາຍງານຫາທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງທ່ານໂດຍ ຮີບດ່ວນ ຖ້າທ່ານຫາກຕັ້ງທ້ອງ.

### ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ຢາ Rifampin ໂດຍບໍ່ເລີບບັນຫາໃດໆ. ບາງຄົນອາດເລີບບັນຫາດັ່ງນີ້:

- ມີໄຂ້ສູງຫລາຍກວ່າ ສາມມື້
- ກິນເຂົ້າບໍ່ແສບ ຫລື ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ
- ທ້ອງໄສ້ປັ້ນປ່ວນ ຫລື ຮາກ
- ເຈັບໃນບໍລິເວນທ້ອງ
- ຍຽວສີເຂັ້ມ (ຄືສີຂອງນໍ້າຊາ ຫລື ກາເຟ)
- ຜິວໜັງ ຫລື ຕາ ເຫຼືອງ
- ມີຕຸ່ມພິດຕາມຜິວໜັງ ຫລື ມີອາການຄ້ັນ
- ຕົນມືມືນ ຫລື ຊາ

### ຖ້າທ່ານມີອາການໃດໜຶ່ງຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້:

1. ຢຸດກິນຢາ.
2. ລາຍງານຫາທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງທ່ານໂດຍ ຮີບດ່ວນ. ບໍ່ຕ້ອງວ່າຖ້າເລີບໝໍໃນການນັດໝາຍ ອັງຖັດໄປ.



ຢ່າລືມກິນຢາ TB ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນຫຼາຍວັນ, ຢາອາດບໍ່ທ່າງານ. ນີ້ແມ່ນບາງວິທີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈື່ຈໍາ ມັນ:

- ເກັບຮັກສາຢາ Rifampin ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຫັນ ມັນ.
- ກິນຢາ Rifampin ໃນເວລາດຽວກັນຂອງມື້. ດົວຢ່າງ, ຫລັງຈາກທ່ານພັດແຂ້ວ ຫລື ກ່ອນທ່ານໄປນອນ.
- ຂໍຮ້ອງຄົນອື່ນຊ່ວຍເຕືອນທ່ານ.
- ໝາຍໃນປະຕິທິນຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກທ່ານກິນ ຢາ Rifampin.
- ຂຽນຂໍ້ຄວາມເຕືອນ ຫລື ການແຈ້ງເຕືອນໃນ ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.
- ໃຊ້ ກ່ອງເຕືອນ ກິນຢາ (pill reminder box).
- ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນມື້ໃດໜຶ່ງ, ຈົດບັນທຶກມັນໄວ້ ເພື່ອທີ່ ທ່ານສາມາດບອກກັບທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງ ທ່ານ ໃນການນັດໝາຍອັງຖັດໄປ.

ເກັບຮັກສາການນັດໝາຍທາງການແພດທັງໝົດຂອງ ທ່ານໄວ້. ທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍທ່ານ ຮັບປະກັນວ່າການປິ່ນປົວຂອງທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນໄປ ດ້ວຍດີ.

ການນັດໝາຍອັງຖັດໄປ ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບ ການປິ່ນປົວ TB:

ວັນທີ:

ເວລາ:

ທ່ານໝໍ ຫລື ພະຍາບານ:

ສະຖານທີ່: