

ما په خپل هېواد کې د نري رنځ (TB) واکسين (BCG) ترسره کړي وو.  
ايا زه لاهم کولی شم په نري رنځ (TB) اخته شم؟



هغه خلک چې د نري رنځ (TB) واکسين يې ترسره کړي وي لاهم په نري رنځ (TB) اخته کېدلی شي.

د نري رنځ (TB) د واکسينو خونديتوب د وخت په تېرېدو سره له منځه ځي.

حتی که تاسو واکسين هم ترسره کړي وي، په وينه کې د ناروغۍ مثبت ښودل په دې معنا دي چې تاسو پټ نري رنځ (LTBI) لری.

د پټ نري رنځ (LTBI) د درملو خوړل به تاسو له فعال نري رنځ (TB) څخه ساتي.

ايا د پټ نري رنځ (LTBI) درلودل زما د کېوالی غوښتنلیک ځنډولی شي؟



د پټ نري رنځ (LTBI) لپاره د درملو خوړل به ستاسو د کېوالی په غوښتنلیک کې ځنډ رامنځته نه کړي.



ستاسو د کېوالی اړوند ډاکټر به ستاسو د روغتیا ریاست ته خبر ورکړي چې تاسو پټ نري رنځ (LTBI) لری.



د روغتیا سیمه ییزه څانګه ښايي د مرستې په موخه له تاسو سره اړیکه ونیسي.

که تاسو د یوه داسې ډاکټر په موندلو کې مرستې ته اړتیا لری چې کولی شي تاسو ته پټ نري رنځ (LTBI) لپاره درمل درکړي، نو خپل د روغتیا سیمه ییزې څانګې ته زنگ ووهی:

سیمه:

د تلیفون

شمېره:

د ساري ناروغیو څېړنه، وقایه او کنټرول  
پوسټ بکس شمېره 64975، سینټ پاول، ماینیسوټا 55164  
1-877-676-5414 یا 651-201-5414  
www.health.state.mn.us

# زما لپاره د پټ نري رنځ (LTBI) درلودل څه معنا لري؟



تاسو کولی شئ د پټ نري رنځ (LTBI) درملنه وکړئ او د خپل ځان او خپلو عزیزانو له ناروغه کېدو څخه مخنیوی وکړئ.

**mn** DEPARTMENT OF HEALTH

## پټ نري رنځ (LTBI) څه شی دی؟ ما څنگه دا میکروب ترلاسه کړم؟

پټ نري رنځ (LTBI) د نري رنځ (TB) په میکروبونو باندې یوه ککړتیا ده چې ستاسو په بدن کې پټه (یا ویده) پاتې کېږي.

تاسو پټ نري رنځ (LTBI) د له هغه چا سره د هواد شریکولو له لارې ترلاسه کړی چې د فعال نري رنځ (TB) ناروغ ؤ.

حتی که تاسو د نري رنځ (TB) واکسین هم ترلاسه کړی وي خو بیا هم ښایي پټ نري رنځ (LTBI) ولری.

## د پټ نري رنځ (LTBI) او فعال نري رنځ (TB) ترمنځ ګڼ شمېر توپيرونه شتون لري:

یو کس چې پټ نري رنځ (LTBI) ولري:

د ناروغۍ احساس نه کوي

د سپني اېکسري پي نورمالې وي

د نري رنځ (TB) میکروبونه نورو ته نه شي خپرولی

درملنه پي کولی شي د فعال نري رنځ (TB) مخه ونيسي

درملنه پي لنډه (له دريو څخه تر څلورو مياشتو) او اسانه ده

یو کس چې فعال نري رنځ (TB) ولري:

ښایي د ناروغه کېدو احساس وکړي

ښایي د سپني اېکسري پي غیرنورمالې وي


د نري رنځ (TB) میکروبونه نورو ته خپرولی شي

د درملني له مخي پي فعال نري رنځ (TB) له منځه تللی شي

درملنه اوږده ده (له شپږو څخه تر 12 مياشتو پوري يا له دې زياته)

## زه ولې باید د پټ نري رنځ (LTBI) لپاره درمل وخورم؟

که تاسو د پټ نري رنځ (LTBI) لپاره درمل ونه خورئ، دا کولی شي په فعال نري رنځ (TB) بدل شي.



فعال نري رنځ (TB) یوه جدي ناروغي ده چې کولی شي تاسو ډېر ناروغه کړي.



نیمایي د فعال نري رنځ (TB) لرونکي ناروغان په روغتون کې بستري دي.

5%

د فعال نري رنځ لرونکي کسان د ناروغۍ له امله مري.

## څرنگه کولی شم د پټ نري رنځ (LTBI) درمل ترلاسه کړم؟

د کډوالۍ له ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ که دوی کولی شي چې ستاسو لپاره درمل راوغواړي.

که دوی نه شي کولی، خپل معمولي ډاکټر ته ورشئ او له هغوی څخه وغواړئ چې ستاسو لپاره درمل راوغواړي. د ویني د معایناتو اسناد له ځانه سره وروړئ.

تاسو کولی شئ له خپلې ځایي روغتیايي څانګې سره اړیکه ونیسئ ترڅو تاسو د درملني لپاره کلینیک ته راجع کړي.

که تاسو درمل ونه خورئ، تاسو په لسو کې یو چانس لرئ چې ستاسو پټ نري رنځ (LTBI) به په فعال نري رنځ (TB) بدل شي.

خپل ځان  
د فعال نري رنځ (TB) له  
ترلاسه کولو او په دې ناروغۍ  
باندې د خپلو  
عزیزانو له ککړېدو مخنیوی  
وکړئ.