






የወሊድ መቆጣጠሪያ ምርጫዎች

ዋና ዋና ነጥቦች








- የትኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ ለእርስዎ ተገቢ እንደሆነ መወሰን ላይ ዶክተርዎ ሊረዳዎ ይችላል ።
- አንዳንድ የወሊድ መቆጣጠሪያ አማራጮች ከኒን፣ ቀዶ ጥገና እና መርፌ ናቸው ።
- የዘዴዎቹ ጊዜ ርዝመት የአጭር ጊዜ ፣ የረጅም ጊዜ ወይም የዘላለም ሊሆን ይችላል።

ዶክተርዎ ነፍሱ ጡር እንደሆኑ ወይም ማርገዝ የሚፈልጉ እንደሆነ ሊጠይቅዎ ይችላል ። ላለማርገዝ ከመረጡ ዶክተርዎ በቀጠሮዎ ወቅት ስለ የወሊድ መቆጣጠሪያ ወይም ስለቤተሰብ ዕቅድ ምርጫዎች ያነጋግርዎታል ።

እነዚህ ጥያቄዎች ሚስጥራዊነታቸው የተጠበቀ ነው። ምስጢራዊ ማለት ዶክተርዎ እና አስተርጓሚዎ መልስዎን ለማንም ሰው አያጋሩም ማለት ነው ። እርስዎን የሚንከባከቡዎት ሐኪሞች እና ነርሶች ብቻ የሕክምና መዝገብዎን ማግኘት ይችላሉ ።

ዘዴ	እንዴት እንደሚጠቀሙበት (አጠቃቀም)	ጥቅሞች	ጉዳቶች	
	ሴት ማምከን	ሐኪም ቱቦዎቹን ይቆርጣል / ይዘጋል	ለዘላለም ይዘልቃል። በጣም ውጤታማ	የሚቀለበስ አይደለም። ከ HIV/STIs አይከላከልም ።
	ወንድ ማምከን (ቫሴክቶሚ)	ሐኪም ቱቦዎቹን ይቆርጣል / ይዘጋል	ለዘላለም ይዘልቃል። በጣም ውጤታማ	የሚቀለበስ አይደለም። ከ HIV/STIs አይከላከልም ።
	ተከላ - ኔክስፕላን	የፕላስቲክ ዘንግ(rod) በቆዳዎ ስር በሀኪም ይቆመጣል	ለ 3 ዓመታት ይሠራል። በጣም ውጤታማ	ያልተለመደ የደም መፍሰስ። ከ HIV/STIs አይከላከልም ።
	IUD- ሚሬና / ሊሌታ	IUD በሐኪም በማህፀን ውስጥ ይተከላል	ለ 5 አመታት የሚያገለግል (Mirena) ወይም ለ 3 አመት (Liletta)። በጣም ውጤታማ	መደበኛ ያልሆነ የደም መፍሰስ ወይም ሽፍታን ወይም የደም መፍሰስ የለም። ከ HIV/STIs አይከላከልም ።
	IUD- ፓራጋርድ	IUD በሐኪም በማህፀን ውስጥ ይተከላል	ለ 10 ዓመታት ይሠራል። በጣም ውጤታማ ። ሆርሞኖች የሉትም ። ጡት ለማጥባት ችግር የለውም	ከባድ የደም መፍሰስ ፣ የከፋ መሸማቀቅ። ከ HIV/STIs አይከላከልም ።



	<p>መርፌ- ዲፖ ፕሮቬራ</p>	<p>መርፌ በየ 3 ወሩ</p>	<p>ጥቂት ወይም ምንም ፔሬድ አይታይም :: ጡት ለማጥባት ችግር የለውም</p>	<p>ያልተለመደ የደም መፍሰስ ወይም ነጠብጣብ:: መውለድ ለመጀመር እስከ አንድ ዓመት ሊወስድ ይችላል:: ከ HIV/STIs አይከላከልም ::</p>
	<p>ክኒን</p>	<p>በተመሳሳይ ሰዓት በየቀኑ መወሰድ አለበት</p>	<p>ፔሬድን መደበኛ እና ህመምን ሊቀንስ ይችላል:: የብጉር እና የወር አበባ ምልክቶችን ሊያሻሽል ይችላል::</p>	<p>ማቅለሽለሽ ፣ ክብደት መጨመር ፣ ራስ ምታት እና በወሲብ ስሜት ላይ ለውጥ ሊያስከትል ይችላል :: ከአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም ::</p>
	<p>ፕሮጂስቲን-ብቻ የሆነ ክኒን</p>	<p>በተመሳሳይ ሰዓት በየቀኑ መወሰድ አለበት</p>	<p>ፔሬድን መደበኛ ሊያደርግ፣ ህመምን ሊቀንስ፣ የብጉር እና የወር አበባ ምልክቶችን ሊያሻሽል ይችላል::</p>	<p>የማቅለሽለሽ ፣ የክብደት መጨመር ፣ ራስ ምታት ፣ በወሲብ ስሜት ላይ ለውጥ ሊያስከትል ይችላል :: ከ HIV/STIs አይከላከልም ::</p>
	<p>ፓች (ተለጣፊ)</p>	<p>በሳምንት አንዴ አዲስ ፓች በቆዳ ላይ ይጠቀሙ ::</p>	<p>ፔሬድን መደበኛ እና ህመምን ሊቀንስ ይችላል:: በየቀኑ የሚወስድ ክኒን የለም::</p>	<p>ቆዳን ሊያስቆጣ ይችላል:: ለ 1-2 ወራት ሽፍታን ያስከትላል:: ከ HIV/STIs አይከላከልም ::</p>
	<p>ሪንግ (ቀለበታማ)</p>	<p>ትንሽ የፕላስቲክ ቀለበት ወደ የሴት ብልት ውስጥ ያስገቡ :: ቀለበቱን (ሪንግ) በየወሩ ይቀይሩ ::</p>	<p>ፔሬድን መደበኛ እና ህመምን ሊቀንስ ይችላል:: በየቀኑ የሚወስድ ክኒን የለም::</p>	<p>የሴት ብልት ፈሳሽን ሊጨምር ይችላል :: ለ 1-2 ወራት ሽፍታን ያስከትላል:: ከ HIV/STIs አይከላከልም ::</p>
	<p>ዲያፍራም</p>	<p>ወሲባዊ ግንኙነት በሚፈጽሙበት እያንዳንዱ ጊዜ በትክክል ያስገቡ ::</p>	<p>ለአጠቃቀም ቀላል:: ሆርሞኖች የሉትም :: ረዘም ላለ ጊዜ ይሠራል ፣ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል::</p>	<p>ወሲባዊ ግንኙነት በፈጸሙ ቁጥር ጥቅም ላይ መዋል አለበት :: HIV/STIs በመከላከል አኳያ ጥቅም የለውም::</p>
	<p>ኮንዶም (የወንድ እና የሴት)</p>	<p>የግብረ-ሰጋ ግንኙነት በፈጸሙ ቁጥር አዲስ ኮንዶም ይጠቀሙ ::</p>	<p><u>HIV ን እና በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፎክሽኖችን ለመከላከል የሚረዱ ብቻኛው ዘዴ ነው</u></p>	<p>ውጤታማ ለመሆን ወሲባዊ ግንኙነት በሚፈጽሙበት እያንዳንዱ ጊዜ ጥቅም ላይ መዋል አለበት ::</p>

These materials have been approved by the Minnesota Center of Excellence in Newcomer Health.
Source: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/intro.html>



EMERGENCY CONTRACEPTION

	<p>የአስቸኳይ ጊዜ የእርግዝና መከላከያ ክኒን (ECP) (ዕቅድ ለ)</p>	<p>ክኒን ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በ 3 ቀናት ውስጥ መወሰድ አለበት :: ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ እስከ 5 ቀናት ድረስ ሊወሰድ ይችላል :: በ 1 ወይም በ 2 ክኒኖች ሆኖ ሊመጣ ይችላል (ሁለቱ ክኒኖች አንድ ላይ መወሰድ አለባቸው) ::</p>	<p>ያለ መድሃኒት ወይም መታወቂያ በአብዛኛዎቹ ፋርማሲዎች ውስጥ ይገኛል (ፋርማሲስት ይጠይቁ)</p>	<p>ካልታዘዘ እና በኢንፎርገንስ ካልተሸፈነ በስተቀር ውድ ሊሆን ይችላል። HIV/STIs በመከላከል አኳያ ጥቅም የለውም።</p>
	<p>ኮፐር - IUD ን (Cu-IUD) የያዘ (ድንገተኛ ጊዜ IUD)</p>	<p>ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመበት የመጀመሪያ ድርጊት ጀምሮ በ 5 ቀናት ውስጥ መውሰድ ይቻላል ::</p>	<p>እንደ መደበኛ የወሊድ መቆጣጠሪያ ሊቀጥል ይችላል</p>	<p>.ለማስገባት የህክምና ባለሙያ ያስፈልጋል። ከ HIV/STIs አይከላከልም ::</p>

ምንጭ: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/intro.html>

