



# ວິທີອຸ້ມລູກຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ສັກຢາວັກຊີນ

ອຸ້ມເດັກນ້ອຍສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນ ແລະ ປ້ອງກັນການເໜັງ ຕັ້ງໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງທ່ານກຳລັງຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ພ້ອມທັງ ເປັນ ການບຸງເບນຄວາມສົນໃຈ, ຈິງເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆ, ຮອງເພິ່ງ ຫຼື ຫາຍໃຈ ເລິກໆ, ການອຸ້ມເດັກນ້ອຍແບບສະບາຍໆ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນ ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳສຳລັບວິທີການອຸ້ມລູກຂອງທ່ານ. ຜູ້ສະໜອງການ ດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະມີຄຳແນະນຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການອຸ້ມລູກໃນ ລະຫວ່າງທີ່ກຳລັງໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນ.

## ອຸ້ມແບບເອົາຫຼັງຕິດກັບໜ້າເອິກຂອງທ່ານ (ດ້ານໜ້າ)

- ອຸ້ມລູກຂອງທ່ານໄວ້ເທິງຕັກຂອງທ່ານຫັນໜ້າອອກໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັບ ທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານນັ່ງ.
- ໂອບກອດລູກຂອງທ່ານໄວ້ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງດຳເນີນການ, ເອົາແຂນຂອງ ທ່ານໄຂ່ວກັນໄວ້ທາງໜ້າຂອງເດັກຈັບແຂນເບື້ອງຂວາຂອງເດັກດ້ວຍມືຊ້າຍ ຂອງທ່ານ ແລະ ແຂນເບື້ອງຊ້າຍຂອງເດັກດ້ວຍມືເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານ.
- ໃຊ້ກີກຂາຂອງທ່ານໜົບຂາທັງສອງຂ້າງຂອງເດັກ ແລະ ເອົາຂາຂອງທ່ານ ໄຂ່ວກັນເຕັງເດັກໄວ້.
- ລະວັງຫົວລູກຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ຕຳໜ້າທ່ານໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເໜັງຕັ້ງ.



## ອຸ້ມລູກຂອງທ່ານປິ່ນເອິກໃສ່ກັນ (ຮັດ ຫຼື ກອດ)

- ເອົາລູກຂອງທ່ານນັ່ງຕັກຫັນໜ້າເຂົ້າຫາທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຂາເດັກນ້ອຍ ກອດແອວທ່ານໄວ້.
- ເອົາແຂນຂອງທ່ານກອດແອວຂອງເດັກນ້ອຍ.
- ເອົາແຂນຂອງເດັກນ້ອຍກອດແອວຂອງທ່ານ ແລະ ກອດເຂົ້າໃຫ້ແໜ້ນ ດ້ວຍແຂນຂອງທ່ານ.
- ລູກຂອງທ່ານສາມາດເອົາຫົວຂອງເຂົາໃສ່ເທິງປ່າຂອງທ່ານ ແລະ ປິ່ນຫົວໄປເບື້ອງກົງກັນຂ້າມກັບການສັກຢາ.
- ຖ້າແຂນຂອງເດັກພາດລົງໃສ່ຫຼັງຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຍູ້ແຂນຂອງເດັກໃສ່ບ່ອນ ເອື້ອຍຂອງຕັ້ງຢ່າງເບົາໆ.



## ອຸ້ມຈາກດ້ານຂ້າງແບບເບົາໆ

- ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານນັ່ງຕັກຫັນທາງຂ້າງເຂົ້າຫາທ່ານ.
- ຮັດແຂນຂອງລູກທ່ານອ້ອມເຂົ້າມາໃສ່ຫຼັງຂອງທ່ານ ແລະ ກົດເຂົ້າຫາ ບ່ອນ ເອື້ອຍຂອງຕັ້ງຢ່າງເບົາໆ.
- ໃຊ້ແຂນຂອງທ່ານກອດຫຼັງຂອງລູກທ່ານໄວ້ ແລະ ຈັບກີກແຂນຂອງເຂົາ.
- ໃຊ້ມືອີກເບື້ອງໜຶ່ງຈັບແຂນ ແລະ ຂາຂອງເດັກນ້ອຍ.



## ອຸ້ມແບບຂ້າງຕໍ່ຂ້າງ

- ນັ່ງຂ້າງໆລູກຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ແຂນຂອງທ່ານກອດປ່າຂອງເດັກ.
- ກອດລູກໃຫ້ແໜ້ນຕິດກັບໂຕທ່ານ.
- ໃຊ້ແຂນຂອງເດັກນ້ອຍກອດຫຼັງຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ ກົດໂຕເຂົ້າເຂົ້າຫາ ບ່ອນເອື້ອຍຂອງຕັ້ງຢ່າງເບົາໆ.
- ຈັບແຂນຂອງເດັກນ້ອຍມາພາດໃສ່ໂຕຂອງທ່ານ.

