



Vaccin anti COVID-19 de Johnson & Johnson: Ce que vous devez savoir

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent désormais les vaccins anti COVID-19 à ARNm (Pfizer et Moderna) au lieu du vaccin anti COVID-19 de Johnson & Johnson.

Pourquoi les recommandations ont-elles été mises à jour?

Les experts ont identifié que le rare problème de coagulation du sang survenant après la vaccination Johnson & Johnson anti COVID-19 a causé quelques décès. Bien que ce problème soit rare, il est très grave, et il existe d'autres vaccins disponibles qui ne présentent pas ce même risque.

Les experts ont mis à jour leurs recommandations après avoir examiné les recherches actuelles sur l'efficacité et la sécurité du vaccin Johnson & Johnson. Ils continuent à examiner la sécurité de tous les vaccins et, si nécessaire, à mettre à jour leurs recommandations sur la base de ces recherches. Toute tendance inhabituelle ou inattendue d'effets secondaires graves et rares est vérifiée et traitée, et les gens sont tenus informés.



Que se passe-t-il si j'ai déjà reçu le vaccin de Johnson & Johnson?

Il est peu probable que vous développiez encore la maladie rare de la coagulation due au vaccin de Johnson & Johnson si plus d'un mois s'est écoulé depuis que vous avez reçu le vaccin.

Si cela fait moins d'un mois, surveillez ces symptômes:

- Essoufflement
- Douleur thoracique
- Gonflement des jambes
- Douleurs abdominales/de l'estomac qui ne disparaissent pas
- Maux de tête sévères ou qui ne disparaissent pas
- Vision floue
- Ecchymoses faciles ou petites taches de sang sous la peau au-delà du site d'injection.

Si vous présentez l'un de ces symptômes après avoir reçu le vaccin, vous devez consulter immédiatement un médecin. Dites au professionnel de santé que vous avez récemment reçu le vaccin de Johnson & Johnson.




Le vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson protège contre une maladie grave due au COVID-19; cependant, les personnes qui ont reçu une injection du vaccin de Johnson & Johnson doivent rester à jour et recevoir une injection de rappel deux mois après leur première injection. Les vaccins Pfizer ou Moderna sont recommandés pour l'injection de rappel.

Dois-je recevoir un autre vaccin?

Vous n'avez pas besoin de recommencer avec un vaccin différent si votre premier vaccin était le Johnson & Johnson.

Si vous avez déjà reçu une injection de rappel de Johnson & Johnson, vous n'avez pas besoin d'autres injections pour le moment.

Si vous n'avez jamais été vacciné, vous devez recevoir une injection de rappel deux mois après votre première injection. Les vaccins Pfizer ou Moderna sont recommandés pour l'injection de rappel.



La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger ainsi que les autres contre le COVID-19.

Si vous n'êtes pas vacciné, parlez-en à votre prestataire de soins de santé ou trouvez un endroit près de chez vous pour vous faire vacciner.

Puis-je encore obtenir le vaccin de Johnson & Johnson si je le souhaite?

Vous pouvez toujours obtenir le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson si c'est le vaccin que vous souhaitez. Sachez que toute personne peut développer des caillots sanguins rares après avoir reçu le vaccin. Cependant, les caillots surviennent le plus souvent chez les femmes âgées de 30 à 49 ans. Discutez avec votre fournisseur de vaccins du vaccin et de ses risques éventuels.

Assurez votre sécurité et celle des autres

Il est important de continuer à suivre les recommandations de santé publique actuelles pour réduire la propagation du COVID-19. Ces mesures aident à soutenir le travail difficile que font les vaccins pour empêcher la propagation du COVID-19 :




Porter un masque.



Rester à la maison si vous êtes malade.



Se laver les mains.



Rester à 6 pieds des autres.

mn MINNESOTA

mn.gov/vaccine