

# ການປິ່ນປົວເນື່ອງຈາກການຕິດ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງ


ຜົນຂອງການກວດພົບເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຕິດເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງ ຫຼື “LTBI.” ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງສ່ວນນ້ອຍໄດ້ແຜ່ຂຍາຍໄປສູ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແລ້ວ, ເຊັ່ນປອດ, ກະດູກ, ຫຼື ໝາກໃອ່ຫຼັງ.

ໃນເວລານີ້, ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງຈະບໍ່ກໍ່ບັນຫາໃດໆໃຫ້ທ່ານເທື່ອ. ມັນຍັງ “ບໍ່ມີຕົວ” ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີຊີວິດຢູ່. ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງຈະ“ບໍ່ມີຕົວ” ຢູ່ໃນ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຫາກຍັງສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ຢູ່. ໃນເມື່ອທ່ານຕິດເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງ LTBI ມັນຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ລະບາດຕໍ່ໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.

ຖ້າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕ້ານທານຕໍ່ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງໄດ້ ມັນຈະ “ຕື່ນຂຶ້ນ” ຂຫຍາຍຕົວ. ເພາະສນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງ LTBI ໄດ້ທຸກເວລາ. ໃນເມື່ອພາດຂອງຍາຍຕົວຂຶ້ນແລະສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ ໂດຍຈະເອີ້ນວ່າ “ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງ” ບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງທີ່ຢູ່ໃນອັ້ນຮ້າຍແຮງນັ້ນ ຈະປ່ວຍຫນັກແລະສາມາດແຜ່ລະບາດ ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.

## ຂ້າພະເຈົ້າຈະປ້ອງກັນ ການເມື່ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງທີ່ແຜ່ລະບາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ມີຢາທີ່ຈະປ້ອງກັນໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ຂຍາຍຕົວ. ຢາ Isoniazid (INH) ແມ່ນຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວ ໂດຍທົ່ວໄປສຳລັບໂຣຄ໌ LTBI. ຢາ INH ຈະຂ້າເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງທີ່ “ບໍ່ມີຕົວ” ຢູ່ນັ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະມີ ໂອກາດທຳໃຫ້ທ່ານປ່ວຍ, ເພາະວ່າເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງນັ້ນມັນຮ້າຍແຮງ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນກ່ອນທີ່ຢານັ້ນຈະຂ້າມັນໄດ້.



ຢາ INH ທຳວາມໄດ້ດີຖ້າທ່ານກິນມັນທຸກໆມື້ຈົນກວ່າທ່ານໝໍຈະປອກໃຫ້ຢຸດ. ກິນຢານີ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກິນຮ່ວມກັບອາຫານ. ທ່ານຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍຂອງທ່ານເດືອນລະເທື່ອໃນຂະນະທີ່ທ່ານກິນຢາ INH ເພື່ອຈະໄດ້ຫນັ້ນໃຈວ່າການປິ່ນປົວນັ້ນໄດ້ຜົນດີ.

## ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງການຢາ ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກປ່ວຍ?

ຢາ INH ຂ້າເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ມັນຈະມີໂອກາດ “ກຳເລີບຂຶ້ນ” ແລະທຳໃຫ້ທ່ານປ່ວຍ. ໃຫ້ຈຳໄວວ່າ, ເຊື້ອ ໂຣຄ໌ປອດແຫ້ງນັ້ນສາມາດຂ້າໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງ “ບໍ່ມີຕົວຢູ່.”

## ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຫຼາຍຄົນໃຊ້ຢາ INH ທຸກໆວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ, ແຕ່ກໍມີສິ່ງເລັກນ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເບິ່ງນຳເຊັ່ນ:

- ເປັນໄອ່ຫຼາຍກວ່າສາມວັນ
- ຮັບປະທານອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ, ຈ່ອຍລົງ, ຫຼືຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ
- ວົງວຽນຫຼືຮາກ: ບາງຄົນກໍວົງວຽນປານກາງໃນເມື່ອເລີ່ມໃຊ້ຢາ INH ຖ້າມີການເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບ, ໃຫ້ກິນອາຫານຮ່ວມນຳເລັກນ້ອຍ ໃນເວລາທ່ານກິນຢານີ້ ຫຼືໃນເວລາກ່ອນນອນ. ຖ້າທ່ານຍັງອ່າການ ເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ ຫຼັງຈາກສາມວັນຜ່ານໄປແລ້ວໃຫ້ ໂທຫາຄລິນິກທ່ານ ດວ່ນ.

- ເຈັບທີ່ທ້ອງນ້ອຍ
- ນ້ຳປັດສະວະສີຂຸ້ນ (ສຶກາເພທຼືສີນ້ຳຊາ)
- ຜິວຫຼືຕາເຫຼືອງ
- ອອກຕຸ່ມຫຼືຄັນຕາມຜິວຫນັງ
- ຮູ້ສຶກມືນຫຼືກະດຽມຕາມມືແລະເຕີນ
- ໄອດົນຫຼາຍກວ່າສາມອາທິດ
- ເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນ

ຖ້າຫາກທ່ານມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ໂທສືບໄປທີ່ຄລິນິກຂອງທ່ານຫນ້າທີ່ບໍ່ໃຫ້ລໍຖ້າຈົນກວ່າຈະເຖິງວັນກຳນົດໄປພົບທ່ານໝໍ.

## ຂໍ້ສຳຄັນອື່ນໆ:

- ການດິນເຫຼົ້າໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢາ INH ຈະທຳລາຍຕັບຂອງທ່ານ, ບໍ່ໃຫ້ດິນເບ້ຍ, ວາຍ, ຫຼືເຫຼົ້າຈົນກະທັ້ງທ່ານປິ່ນປົວໂຣຄ໌ນີ້ແລ້ວ.
- ແນ່ໃຈວ່າໃຫ້ບອກທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າທ່ານຫາກໃຊ້ຢາຊະນິດອື່ນໆອີກ ຫຼືວ່າທ່ານຖືພາ.



# ການປິ່ນປົວເນື່ອງຈາກການຕິດໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງ - ໜ້າ 2

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຊ້ຢາ ຈະເປັນຢ່າງໃດ?

ຖ້າທ່ານບໍ່ກິນຢາທີ່ມີເຊື້ອໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງໃຊ້ຢາທີ່ມີໄວກວ່າກຳນົດ, ທ່ານອາດຈະກັບມາເກີດປ່ວຍແລະແຜ່ຂ້າຍເຊື້ອໂຮຄ໌ນັ້ນ. ນັ້ນກໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນ ທີ່ມີເຊື້ອໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງ LTBI ທີ່ຈະແຜ່ລະບາດ ໄດ້ທຸກເວລາ. ຢາປ່ອຍໃຫ້ເຫດການເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານແລະຄອບຄົວທ່ານ.!

ຖ້າຂ້ອຍໄດ້ສັກຢາວັນຊົນ BCG ຂ້ອຍຍັງຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງອີກ?

ໃນປະເທດບ່ອນທີ່ມີເຊື້ອໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງຫຼາຍ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະສັກຢາວັນຊົນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ BCG. ຢາ BCG ສາມາດປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍຈາກການຕິດເຊື້ອໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງ, ແຕ່ກົນຮງກຸ້ມໄປໄດ້ສອງສາມປີເທົ່ານັ້ນ.

ບຸກຄົນທີ່ສັກຢາ BCG ສາມາດຕິດເຊື້ອໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງແລະແຜ່ລະບາດໄດ້! ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອຢາ BCG, ທ່ານຍັງສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົວເອງ ໂດຍການໃຊ້ຢາເພື່ອກັນໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງ LTBI ໄດ້.

ຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະຊື້ຢາມີເດ?

ຖາມນຳທ່ານໝໍຫຼືນາງພຍາບານ ເພື່ອຈະອໍເອົາຢາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈາກທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຣັຖມົນນີໂຊຕາ.

ຖ້າຂ້ອຍຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນເດ?

ຖ້າທ່ານຍ້າຍໄປຢູ່ຮູ້ທີ່ເມືອງອື່ນ, ບອກທ່ານໝໍກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍ. ເພິ່ນຈະຊ່ວຍທ່ານເພື່ອໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງໃນເຮືອງການໃຊ້ຢານັ້ນຫຼັງຈາກ ທ່ານຍ້າຍໄປ.

ປ້ອງກັນທ່ານ, ຄອບຄົວ, ເພື່ອນຝ່ຽງຈາກໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງ – ໃຫ້ກິນຢາປິ່ນປົວໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງໃຫ້ຈົນຄິບຕາມກຳນົດ!

**ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະບໍ່ລົມກິນຢາປິ່ນປົວໂຮຄ໌ປອດແຫ້ງນີ້?**

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນຈະກິນຢາ INH ທຸກວັນ. ຖ້າທ່ານລົມກິນຢາຫຼາຍວັນ, ຢານັ້ນອາດຈະບໍ່ທຳງານດີ. ພຍາຍາມກິນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າທ່ານໝໍບອກໃຫ້ຢຸດ.

ບາງວິທີອາດຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ລົມກິນຢາ:

- ເກັບຢາໄວ້ບ່ອນທີ່ທ່ານມັກຈະຫລຽວເຫັນເລື້ອຍໆໃນທຸກໆວັນ.
- ບອກໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວຫຼືໝູ່ເພື່ອນຊ່ວຍເຕືອນທ່ານທຸກວັນ.
- ໝາຍໃສ່ໄວ້ໃນປະຕິທິນທຸກວັນຫຼັງຈາກທ່ານກິນຢາແລ້ວ.
- ໃຊ້ກ່ອງຢາຊະນິດທີ່ຂຶ້ນເປັນຫ້ອງໝາຍໄວ້ໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອຊ່ວຍເຕືອນບອກ.
- ກິນຢາໃນເວລາດຽວກັນທຸກໆວັນ. ຕົວຢ່າງ ຫຼັງຈາກກູ້ເຂົ້ວກິນເຂົ້າເຊົ້າ, ຫຼືກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າອນ.

ຖ້າທ່ານລົມກິນມາຫຼາຍວັນ, ຈົ່ງບັນທຶກໄວ້ເພື່ອບອກໃຫ້ທ່ານໝໍຮູ້ຕອນທີ່ຈະໄປກວດນຳເພິ່ນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປນັ້ນ.

ຄລິນິກ/ ທ່ານໝໍ/ ນາງພຍາບານຂອງທ່ານ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ໂທຣສັບ: \_\_\_\_\_



Tuberculosis Prevention and Control Program  
P.O. Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-5414  
1-877-676-5414  
[www.health.state.mn.us/tb](http://www.health.state.mn.us/tb)