


Minnesota Department of Health- Informacijski letak

## TB kožni test (Mantoux)

Kožni test za tuberkulozu (TB), poznat i po imenu “Mantoux,” jest jednostavan, bezopasan način provjere imate li prikrivenu TB infekciju.



### Šta je prikrivena TB infekcija?


Dvije su faze u TB. Obje se faze mogu liječiti lijekovima. Kada klice TB prvi put uđu u vaše tijelo, one prouzrokuju prikrivenu infekciju TB-om. Ako se ne liječi, prikrivena infekcija TB-om može postati aktivna bolest. Bilo ko može dobiti TB jer se ona prenosi s osobe na osobu preko zraka.

Faza 1 – Latentna TB infekcija	Faza 2 – Aktivna TB - tuberkuloza
Klice TB “spavaju” u vašem tijelu. Ova faza može trajati vrlo dugo – čak godinama.	Klice TB su aktivne i šire se. One uništavaju tkivo u vašem tijelu.
Vi ne izgledate i ne osjećate se bolesno. Vaša rentgenska slika je obično u redu.	Obično se osjećate bolesno. Vaš liječnik će poduzeti specijalne testove da ispita da li TB nanosi štetu vašem tijelu.
Ne možete raširiti TB na druge ljude.	Ako su klice TB u vašim plućima, vi možete širiti TB na druge ljude kašljanjem, kihanjem, govorenjem ili pjevanjem.
Obično se liječi uzimanjem jednog lijeka u trajanju od 9 mjeseci.	Liječi se uzimanjem 3 ili 4 lijeka barem 6 mjeseci.

### Kako možemo znati da li imamo latentnu TB infekciju?

TB kožni test (“Mantoux”) može pokazati da li imate latentnu TB infekciju. Mogli ste dobiti latentnu TB infekciju ako ste ikada bili u blizini nekoga s aktivnom tuberkulozom (čak i ako niste znali da je drugi bolestan).

Vaš zdravstveni radnik će malom iglom ubrizgati malo bezopasne probne tekućine (zване “tuberkulin”) ispod kože na vašoj ruci.



**Vaš zdravstveni radnik MORA provjeriti vašu ruku 2 ili 3 dana nakon ovog kožnog TB testa, čak i ako se vama čini da je ruka u redu.**

Ako vam se pojavi reakcija na test, izgledat će kao izdignuta kvržica. Vaš zdravstveni radnik će izmjeriti veličinu reakcije. Kvržica će, ako je ima, nestati za par sedmica.

### Kako se treba brinuti o ruci nakon primanja kožnog TB testa?

- Ne pokrivate to mjesto zavojem ili flasterom.
- Budite pažljivi da ne trljate ili ogrebete to mjesto.
- Ako vas svrbi, prekrijte ruku hladnom krpom.
- Ruku možete prati i brisati pažljivo.



## TB kožni test (Mantoux) - stranica 2

**Ne bojte se testiranja. TB se može izliječiti!**

### Šta ako je moj kožni TB test negativan?

Test je “negativan” ako nema kvržice (ili je ona vrlo mala) na mjestu gdje je ubrizgana tekućina. Negativan kožni TB test obično znači da nemate TB.

U nekim slučajevima, možda će trebati kasnije ponoviti ovaj TB test.

### Šta ako je moj kožni TB test pozitivan?

Test je “pozitivan” ako se pojavi kvržica određene veličine na mjestu gdje je ubrizgana tekućina. To znači da vjerojatno imate klice TB u vašem tijelu. Većina ljudi s pozitivnim kožnim TB testom ima prikrivenu TB infekciju. Za svaki slučaj, vaš liječnik će vas pregledati i uputiti na snimanje pluća. Možda ćete imati i druge testove da se ispita da li imate aktivnu tuberkulozu.

**Zaštitite svoje zdravlje i zdravlje vaše obitelji - idite na kožni TB test!**

Kontaktirajte vašeg liječnika ili zdravstvenog radnika u vezi s kožnim TB testom.

### Trebali bi se testirati kožnim TB testom ako:

- ste bili češće u bliskom kontaktu s nekim ko je imao aktivnu TB,
- ste živjeli u zemlji gdje su mnogi ljudi bolovali od TB,
- radite ili živite u staračkom domu, klinici, bolnici, zatvoru, ili u domu za beskućnike, ili
- ste inficirani HIV-om ili imate određene druge zdravstvene probleme.

### Šta ako sam jednom primio BCG vakcinu?

Čak ako ste nekada primili BCG vakcinu, još uvijek se možete podvrći kožnom TB testu.

- Ljudi koji su jednom primili BCG vakcinu još uvijek mogu dobiti prikrivenu TB infekciju, kao i aktivnu TB bolest.
- BCG vakcina može pomoći u zaštiti male djece od teškog oboljenja od TB. Ova zaštita nestaje kako ljudi postaju stariji.
- BCG vakcina ponekad uzrokuje pozitivnu reakciju na kožni TB test. Ali ako imate pozitivnu reakciju na kožni TB test, to je vjerovatno od klica TB u vašem tijelu - ne od same BCG vakcine.

**Čak ako ste nekada primili BCG vakcinu, još uvijek se možete podvrći kožnom TB testu!**



Tuberculosis Prevention and Control Program  
P.O. Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-5414  
1-877-676-5414

[www.health.state.mn.us/tb](http://www.health.state.mn.us/tb)