

¿Están listos sus hijos?

Qué requiere la ley de inmunización de Minnesota

Requisitos de vacunación

Use esta tabla como una guía para determinar qué vacunas se requieren para la inscripción en cuidado infantil, programas para la primera infancia y la escuela (en línea, educación en la casa, pública o privada).

Encuentre la edad o el grado del menor y vea si su hijo o hija ha recibido el número de vacunas que muestran las marcas debajo de cada vacuna. La tabla en la parte posterior muestra las edades a las que deben aplicarse las dosis.

Del nacimiento hasta 4 años	Edad: De 5 a 6 años ³	Edad: De 7 a 11 años	Edad: 12 años y mayores
Programas de niñez temprana y cuidado infantil	Para kindergarten	Para los grados 1.º a 6.º	Para los grados 7.º a 12.º
Hepatitis A (Hep A) ✓			
Hepatitis B (Hep B) ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ⁷ ✓✓✓
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP/DT ⁴ ✓✓✓✓✓	✓✓✓ vacunas que contienen ⁶ dosis contra el tétanos y la difteria	✓ Tdap y DTaP o serie para ponerse al día
Polio ✓✓✓	Polio ⁵ ✓✓✓✓	Polio ⁸ ✓✓✓	Polio ⁸ ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Meningocócica (ACWY) ⁹ ✓ y refuerzo
Pneumocócica ¹ ✓✓✓✓			
Varicela ² ✓	Varicela ² ✓✓	Varicela ² ✓✓	Varicela ✓✓

¡No es demasiado tarde! Si su hijo se ha retrasado en sus vacunas, hable con su médico o clínica para ponerse al día.

Vacunas recomendadas pero no obligatorias:

COVID-19 Para todos los niños en un grupo de edad elegible	
Gripe Anualmente para niños de 6 meses y mayores	
Rotavirus Para infantes	Virus del papiloma humano A la edad de 11 a 12 años

- 1 No se requiere después de 24 meses.
- 2 Si el menor ya tuvo varicela, no se requieren vacunas de varicela. Si la enfermedad se presentó después del año 2010, el médico del menor tiene que firmar un formulario para confirmar la enfermedad.
- 3 Los alumnos de primer grado que tengan 6 años y menos tienen que seguir los calendarios para la polio y DTaP/DT para kindergarten.
- 4 La quinta vacuna de DTaP no es necesaria si la cuarta vacuna se aplicó después de los 4 años de edad. Dosis final de DTaP a los 4 años o después.
- 5 La cuarta vacuna de polio no es necesaria si la tercera vacuna se aplicó después de los 4 años de edad. Dosis final de polio a los 4 años o después.
- 6 Una dosis debe haber contenido la vacuna contra la tos ferina (es decir, DTaP o Tdap) y una dosis se debe haber administrado después de cumplir los cuatro años. Si la primera dosis de la serie se administró antes de los 12 meses de edad, entonces son necesarias cuatro dosis.
- 7 También puede usarse un calendario alternativo de dos vacunas de hepatitis B para niños de 11 a 15 años.
- 8 Se debe haber administrado al menos una dosis después de cumplir los 4 años. Si la tercera dosis se administró antes de cumplir los cuatro años, es necesaria una cuarta dosis.
- 9 Se requiere una dosis de la vacuna meningocócica conjugada ACWY al comienzo del 7.º grado. Se recomienda la dosis de refuerzo de la vacuna meningocócica conjugada ACWY a los 16 años y es un requisito para los estudiantes de 12.º grado.


Exenciones

Para inscribirse en los programas de cuidado infantil, niñez temprana y escuelas en Minnesota, los niños tienen que comprobar que han recibido estas vacunas o presentar una exención legal.

Los padres pueden presentar una exención legal firmada por un proveedor de atención de salud o una exención no médica firmada por el padre, madre o tutor y notariada.

Cuándo vacunarse, desde el nacimiento hasta los 16 años

(Programa de vacunación recomendado por los CDC)



¡Le preocupa el costo?
 Hay vacunas gratis o de bajo costo disponibles. Hable con su médico o personal de la clínica.

¡No es demasiado tarde! Si su hijo se ha retrasado en sus vacunas, hable con su médico o clínica para ponerse al día.

La ley de Minnesota requiere una prueba escrita de ciertas vacunas para niños en cuidado infantil, programas para la primera infancia y la escuela. Sin embargo, si un niño tiene una razón médica o si sus padres se oponen a alguna o todas las vacunas, hay una exención legal disponible.

Los niños con ciertas afecciones médicas pueden necesitar vacunas adicionales (p. ej., antineumocócica o meningocócica). Hable con su médico o clínica.

¿Está embarazada? Protéjase y proteja a su bebé de la tos ferina. Póngase una vacuna Tdap entre las 27 y las 36 semanas de gestación. Hable con su médico.

*El número de dosis depende del producto que use su médico.

Dos dosis para niños de 9 a 14 años; tres dosis para personas de 15 a 26 años. Para obtener copias de los registros de vacunación de su hijo, llame a su médico. Puede obtener consejos adicionales para encontrar registros de vacunas en **Find My Immunization Record (Encontrar Mi Registro de Vacunación) (www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/records.html), o llame a Conexión de Información de Vacunación de Minnesota (MIIC) al 651-201-3980.

Clave de las abreviaturas de las vacunas

DTaP/Tdap	= difteria, tósferina, tétanos	Hib	= Haemophilus influenzae tipo b
Hep B	= hepatitis B	IPV	= polio
MMR	= sarampión, paperas, rubéola	PCV	= pneumocócica
		RV	= rotavirus
		MCV	= meningocócica

Immunization Program
 651-201-5503 or 1-800-657-3970
www.health.state.mn.us/immunize

